

Aus der Königlichen Universitäts-Frauenklinik zu Breslau.

Direktor: Geheimer Medizinalrat Professor Dr. Küstner.

Die Geburten bei engem Becken in den Jahren 1900/01 bis 1902/03.

Inaugural-Dissertation

der

Hohen Medizinischen Fakultät der Kgl. Universität
Breslau

zur


Erlangung der Doktorwürde

in der

Medizin und Chirurgie

vorgelegt von

Paul Kapischke.



Breslau 1907.

Druck der Breslauer Genossenschafts-Buchdruckerei, E. G. m. b. H.

**Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät der
Universität Breslau.**

Referent: Professor Dr. Küstner.

Bonhoeffer, Dekan.

Meinen Eltern

in Dankbarkeit.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Die Frage nach der zweckmässigsten Leitung der Geburt beim engen Becken kann in letzter Linie nicht durch bloße theoretische Erwägungen gelöst werden, sondern nur auf Grund der Erfahrungen, die von den Vertretern der einzelnen geburtshilflichen Richtungen im Laufe der Jahre gemacht sind, d. h. auf dem realen Boden der Statistik. Es ist nun auch eine grosse Anzahl von Statistiken geliefert worden. Dieselben sind aber nach so verschiedenen Gesichtspunkten verfasst, dass eine unmittelbare Vergleichung derselben unmöglich ist.

Schon darüber, von welcher Veragrösse an abwärts ein Becken als verengt anzusehen ist, besteht Verschiedenheit der Ansichten. Litzmann, Zweifel und Krönig setzen die obere Grenze für das allgemein verengte Becken auf 10,0 cm, für das platte und allgemein verengte Becken auf 9,5 cm Vera an, während Wolff und Magnus in ihren Arbeiten über die prophylaktische Wendung das enge Becken allgemein bis zu 11,75 Diagonalis rechnen. Ich habe in meiner Statistik alle Becken von Vera 10,0 an und darunter aufgeführt.

Weiterhin herrscht unter den einzelnen Autoren grosse Meinungsverschiedenheit über die Art der Berechnung der Vera aus der Diagonalis. Während, um nur 3 Beispiele anzuführen, nach v. Winckel im Durchschnitt 1,5 cm von der Diagonalisgrösse abzuziehen sind, um die Grösse der Vera zu erhalten, macht Baisch einen Abzug von 2 cm. Olshausen tritt in seinem Lehrbuche der Geburtshilfe mit Nachdruck für die Subtraktion von 1,75 cm ein und wendet sich entschieden gegen eine solche von 2 cm. Ich kann mich mit einem derartigen schematischen Abzug überhaupt nicht einverstanden erklären und muss die Forderung auf-

stellen, künftighin im Interesse der Exaktheit der Statistik in jedem einzelnen Falle die Vera besonders zu berücksichtigen und besonders anzugeben, sei es unter Zugrundelegung der Diagonalisgrösse bei sorgfältiger Abschätzung der im Einzelfalle vorliegenden individuellen Verhältnisse, sei es rein objektiv durch direkte Messung mit dem Zirkel. Nur auf diese Weise kann der Forschung nach dem Verlaufe der Geburt beim engen Becken und ihrer zweckmässigsten Leitung eine stabile Grundlage gegeben werden. Leider ist auch in den von mir bearbeiteten Jahrgängen die Veragrösse nur in der Minderheit der Fälle verzeichnet. Ich habe daher der Not gehorchend nicht dem eigenen Trieb die Veragrösse nach dem Vorgange von Baisch durch konsequenten Abzug von 2 cm von der Diagonalis erhalten. Nur in den vereinzelt Fällen, in denen ich die Vera extra verzeichnet fand, habe ich dieses Mass angeführt und, falls sich dasselbe nicht gerade um 2 cm von dem Masse der Diagonalis unterschied, durch einen Stern markiert. Es kann sich somit jeder, der die Vera auf andere Art aus der Diagonalis berechnet, meine Statistik nach seinem Urteile zurechtlegen und seine Resultate mit den vorliegenden vergleichen.

Eine fernere Schwierigkeit lag in der Anordnung und Gruppierung des Materials. Mag auch die Beckeneinteilung Litzmanns nach einzelnen Verengerungsgraden wohl am meisten Anklang gefunden haben, so habe ich sie gleichwohl meiner Arbeit nicht zugrunde gelegt. Haftet ihr doch immerhin etwas Willkürliches und Gekünsteltes an. Ich habe in meinem Bestreben, meiner Abhandlung eine möglichst natürliche Grundlage zu geben, die denkbar einfachste Einteilung bevorzugt, wie es bereits vor mir von Baisch und Kretschmer (Inaugural-Dissertation über das enge Becken, Breslau 1907) geschehen ist, nämlich die nach Zentimetern.

Die Trennung zwischen allgemein verengten und platten Becken allein auf Grund äusserer Messungen, wie sie neuerdings vielfach vorgenommen wird, habe ich nicht gemacht.

Um zu entscheiden, ob ein Becken allgemein verengt oder nur platt ist oder ob vielleicht sogar beides vorliegt, bedarf es doch wohl namentlich bei den leichteren Graden der Beckenverengerung einer genauen Abtastung, besser noch Messung des Beckeninnern. Ausserdem besteht ja auch nach Baisch zwischen platten und allgemein verengten Becken in prognostischer Hinsicht kein Unterschied. — Wohl aber habe ich die Scheidung zwischen Erst- und Mehrgebärenden streng durchgeführt.

Möge es meiner kleinen Arbeit beschieden sein, zur Lösung der überaus komplizierten Frage nach der besten Therapie der Geburt bei engem Becken wenn auch in noch so bescheidenem Masse mit beizutragen.

Erklärungen zu dem Verzeichnis der Fälle.

P. = der Fall ist dem poliklinischen Material entnommen.

Kl. = der Fall ist dem klinischen Material der geburtshilflichen Station entnommen.

Gyn. = der Fall ist dem Material der gynäkologischen Station entnommen.

ext. = Coniugata externa.

Schl. = Schädellage.

vorz. = vorzeitig (sc. der Blasensprung).

p. p. = post partum.

af. = afebril.

o. B. = ohne Besonderheiten.

L. = Länge.

Std. = Stunden.

Stl. = Steisslage.

knstl. = künstlich.

K. U. = Kopfumfang.

Nbschnschl. = Nabelschnurumschlingung.

Die unter der Rubrik „Beckenmasse“ angegebenen Zahlen beziehen sich von links nach rechts gelesen auf Distantia spinarum, cristarum, Coniugata externa und Coniugata diagonalis.

Vera 10,0—9,6.

Lfd. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
---------------------------------	-------	----------	------------------	-----------------	-------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------	------	-------------

I. Erstgebärende.

Spontangeburt.

1. 02/03. Kl. 679	27	I. p.	26 28,5 19 12	I. Schl.	—	13 1/2	—	o. B.	M. 2800, L. 52. † 1 Std. p. p.	—
2. 02/03. Kl. 616	19	I. p.	25,5 30,5 diag. 12	"	—	5	—	"	M. 2930, lebt	—
3. 02/03. Kl. 611	19	I. p.	24,5 27,5 20,5 11,75	II. Schl.	—	20	—	"	K. 3500, lebt	—
4. 02/03. Kl. 607	31	I. p.	26 29,8 21 12	"	—	30	—	"	K. 3260, lebt	—
5. 01/02. Kl. 501	18	I. p.	23 26,5 18,5 12	I. Schl.	—	16	Nbschnschl.	"	K. 2600, leicht asph.	—
6. 00/01. Kl. 484	24	I. p.	23 25,5 18 11,5 * V. 10	II. Schl.	—	9 3/4	—	"	M. 3150, lebt	—
7. 01/02. Kl. 188	19	I. p.	24 26 19 12	"	—	5 1/2	—	"	K. 2650, lebt	—
8. 01/02. Kl. 40	18	I. p.	23 26 18 12	"	vorz.	18 3/4	—	"	M. 2270, lebt	—
9. 01/02. Kl. 39	18	I. p.	23 27 19 12	"	—	6 1/2	—	"	M. 3350, lebensfrisch	—
10. 00/01. Kl. 21	24	I. p.	24 29 17 12	I. Schl.	—	18 3/4	—	"	K. 2550,	—

12. 00/01. Kl. 454	21	I. p.	25 17	29 12	"	vorz.	7 ³ / ₄	—	Tag 3: 38 ⁰	M. 2770. Vorderes Scheitelbein unter d. hintere geschoben. Lebt	—
13. 00/01. Kl. 446	22	I. p.	26 19	30 12	"	—	38	—	o. B.	K. 3330, lebt	—
14. 00/01. Kl. 443	24	I. p.	25 18	28,5 12	"	—	24	Nbschmschl.	"	M. 3200, asph., lebt	—
15. 00/01. Kl. 432	18	I. p.	23,5 18	27 12	II. Schl.	—	20 ¹ / ₄	—	"	K. 3500, lebt	—
16. 00/01. Kl. 205	21	I. p.	26 18	29,5 12	I. Schl.	—	10	—	"	K. 2750, lebt	—
17. 00/01. Kl. 382	26	I. p.	24 18	28 12	"	—	8 ¹ / ₂	—	Tag 1: 38,6 ⁰	K. 3100, lebt	—
18. 02/03. Kl. 18	—	I. p.	23,5 18	28 11,75	Gemini 1. vollkom- mene Fussl. 2. F. Stl.	—	4 ¹ / ₄ 5	—	o. B.	M. 2030, M. 2160, leicht asph., leben	Veit-Smellie beim 1. Kinde.
19. 01/02. Kl. 102	21	I. p.	23 19	25,5 12	I. Schl.	—	6 ¹ / ₂	—	"	M. 3000, lebt	Leichter Dammriss.

Operative Entbindungen.

Zange.

20. 00/01. Kl. 640	21	I. p.	20,5 18,5	25 11,5-12	II. Schl.	vorz.	41	Schwanken der Herztöne	Mehr- mals 38 ⁰ . Damm- riss heilt p. sec.	K. 3950, asph., lebt, a. link. Schb. bohnengr. Druckmarke	Zange. Scheidenriss. Totaler Dammriss.
-----------------------	----	-------	--------------	---------------	-----------	-------	----	------------------------------	---	---	---

Life. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
----------------------------------	-------	----------	------------------	-----------------	-------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------	------	-------------

II. Mehrgebärende.

Spontangeburt.

21. 01/02. Kl. 638	20	II. p. P. 1 Frühgeburt, mens. VIII. † nach 5 Mon. an Lungenentzündg.	24 28 20 12	I. Schl.	knstl. 29 ¹ / ₂	—	—	2mal 38 ^o . Schrunden	K. 3350, lebt	—
22. 02/03. Kl. 143	23	II. p. P. 1 normal, Kind † nach 2 Tagen	23 28 18 11,5-12	"	—	56	—	o. B.	M. 3670, Kopf doli- chocephal., lebt	—
23. 02/03. Kl. 579	21	II. p. P. 1 normal	23 28 20 11,75	II. Schl.	—	8 ¹ / ₂	—	"	K. 3000, lebt	—
24. 02/03. Kl. 105	30	II. p. P. 1 normal	23 26 18 12	"	—	23	—	"	K. 2540, lebt	—
25. 09/01. Kl. 473	32	III. p. Kind 1 lebt, Partus normal. Kind 2 † n. 1 Jahre angeblich an Hirn- hautentzündung (Lues)	25,5 29 18,5 11,5-12	I. Schl.	vorz.	25	—	"	M. 2790, lebt	—
26. 02/03. Kl. 440	34	V. p. P. 1 normal. P. 2 † n. 1 Jahre, angeblich an Hirn-	25,5 29 18,5 11,5-12	II. Schl.	—	6	—	"	M. 3320, lebt	—

	P. 2 Zwillinge im 6. Monat, tot						Hinterhaupt lang ausgez.
28. 01/02. Kl. 204	35	II. p. P. 1 normal	21 26 19 12	"	—	17 ¹ / ₂	Tag 8: 38,50 9: 39,80 " 10 15: " 380, — M. 2120, lebt
29. 01/02. Kl. 147	28	II. p. P. 1 leicht	22,5 25 18,5 12	"	—	7 ¹ / ₄	3750, lebt
30. 01/02. Kl. 43	34	III. p.	23,5 26,5 19 12	"	—	10 ³ / ₄	K. 3220, lebt
31. 01/02. Kl. 399	43	IX. p.	25 27,5 18 12	"	—	11	M. 3550, L. 54, K. U. 36 † gleich p. p.
32. 02/03. Kl. 544	28	V. p.	28,25 25 21 11,75	I. Ge- sichts- lage	—	29	M. 3500, lebt
33. 01/02. Kl. 232	22	II. p. P. 1 normal	24 27 18,5 11,5-12	I. Schl.	—	8 ¹ / ₂	K. 4150, K. U. 37, leicht asph., lebt
34. 01/02. Kl. 364	27	IV. p. P. 1—3 normal, schnell	22 25,5 19 12	II. Schl.	—	2 ³ / ₄	K. 3400, lebt
35. 01/02. Kl. 339	26	II. p. P. 1 leicht	25 27 19 12	I. Schl.	—	18 ³ / ₄	M. 3100, lebt
36. 01/02. Kl. 229	36	IV. p.	23,5 27,5 19 12	II. Schl.	—	2 ¹ / ₄	M. 3650, lebt
37. 00/01. Kl. 588	29	V. p. P. 1—4 normal	25,5 30 19,5 12	"	—	4 ¹ / ₄	K. 3770, lebt
38. 00/01. Kl. 507	24	II. p. P. 1 leicht	23 28 18 11,75	"	—	11	M. 3000, lebt

Frde. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- barts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
39. 00/01. Kl. 193	24	III. p.	25 29,5 19 12	I. Schl.	—	18 1/2	—	o. B.	M. 3380, lebt	—
40. 00/01. Kl. 6	42	VIII. p.	25 27,5 18 12	II. Schl.	—	4 1/2	—	"	K. 3520, lebt	—
41. 00/01. Kl. 524	23	II. p. P. 1 angebl. 48 Std.	23 27 18 12	I. Schl.	—	3 1/4	—	"	M. 3760, lebt	—
42. 00/01. Kl. 515	21	II. p. P. 1 o. B.	23 26 18 12	"	—	11 3/4	—	Tag 5: 37,6° Schrunden	M. 3250, lebt	—
43. 00/01. Kl. 498	37	V. p. P. 1—4 o. B.	24,5 26,5 18 12	"	—	5	—	o. B.	K. 4070, L. 54, K. U. 35, lebt	—
44. 00/01. Kl. 470	38	V. p. P. 1—4 o. B.	25 28 17 11,5-12	"	—	22	—	Tag 2: 37,6° " 3: 37,8° " 4: 39,6° Mastitis	K. 2300, lebt	—
45. 00/01. Kl. 450	27	II. p. P. 1 glatt. Wochenbett febril.	24 30 19 11,75	II. Schl.	—	1 1/2	—	5 Wochen lang Fieber. re- u. inter- mittierend. Charakter bis geg. 40°	M. 2500, lebt	Manuelle Placentar- lösung. Linke Adhese bei der Entlassung Spur verdickt.
46. 02/03. Kl. 103	27	III. p. P. 1 spontan. P. 2 Zange. Beide Kinder † angebl. an Zahnkrämpfen	22 25,5 18,5 11,75	I. Schl.	knstl.	—	Leichte Eklampsie	o. B.	K. 3550, leicht asph. lebt	Spontan nach Hyster- euryse.
47. 00/01. Kl. 274	25 1/2	III. p. P. 1 spontan, P. 2 Zange. Beide Kinder † angebl. an Zahnkrämpfen	22 25 18 12	"	vorz.	41 3/4	—	"	K. 3800, mit Mecon. bedeckt.	—

49. 00/01. Kl. 376	22	spontan	21,5 26,5 16 12	III. p. P. 1 lebt. P. 2 Abort	—	—	7	—	Mehrm. Tempera- turen 38° o. B.	K. 2750, lebt	—
50. 01/02. Kl. 284	22	II. p.	25,5 28,5 19 11,5 12	II. Schl.	—	—	10 1/2	—	o. B.	K. 3540, lebt	—
51. 01/02. Kl. 292	22	II. p. P. 1 glatt	24 27 18,5 11,5-12	I. Schl.	—	—	8 1/4	Nbschenschl.	—	K. 4150, L. 54, K. U. 37, leicht asph., lebt	—
52. 01/02. Kl. 242	21	III. p. P. 1 glatt. P. 2 Abort	24 26,5 17,5 11,5-12	—	—	—	4	—	—	M. 3620, lebt	—

Operativ beendigte Geburten.

1. Zange.

53. 01/02. Kl. 637	23	II. p. P. 1 Zange, lebendes Kind, totaler Dammriss	20,5 25 18,5 11,5-12	II. Schl.	vorz.	41	Drohende Asphyxie des Kindes	o. B.	K. 3550, schwer asphyktisch, aber lebend	Cervix- u. Dammriss,
-----------------------	----	---	-------------------------	-----------	-------	----	------------------------------------	-------	---	----------------------

2. Extraduktion am Steiss.

54. 01/02. Kl. 459	33	VI. p. P. 1 5 sehr schwer, 2-3 Tage dauernd, stets Zange. 3 Kinder starben gleich nach der Geburt, 2 leben	24 27 17,5 11,5 *V. 10-9,75 (Zirkel)	Stl.	kunstl.	2 1/4	Drohende Asphyxie des Kindes; doppelte Nbschenschl.	—	K. 3450, Armbruch. † nach 3 Std.	Hystereuryse. Wigand-Martin- Winckelscher Hand- griff.
-----------------------	----	--	---	------	---------	-------	---	---	--	---

Lfd. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
3. Wendung und Extraktion.										
55. 02/03. Kl. 442	29	II. p. P. 1 spontan	diag. 12	II. Schl.	—	18	Starke Cervix- dehnung	1mal 37,8°	K. 3500, leicht asph., lebt	Impression nach Hof- meier missglückt.
56. 00/01. Kl. 257	33	IV. p. P. 1—3 normal	23 28,5 19 12	II. Quer- lage	—	6 ³ / ₄	—	o. B.	M. 2950, asph., lebt	—
57. 02/03. Kl. 627	35	VI. p. P. 1 Zange, P. 2—5 o. B.	23 27 diag. 11,75	Gemini Kind 1: II. Stl. Kind 2: II. Querlage	—	65 65 ³ / ₄	—	„	Knaben 2680, 2880. K. 1 asph., lebt. K. 2 asph., lebt	Kind 1: spontan. „ 2: Wendung u. Extraktion. Veit-Smellie.

Vera 9,5—8,6.

I. Erstgebärende.

Spontangeburt.

58. 01/02. Kl. 227	23	I. p.	24 25 16,5 10,75	I. Schl.	knstl.	35	—	Tag 5: 38,2°	M. 3120, lebt. Kopf stark konfiguriert	Scheiden-Klitoris- Dammriss.
59. 01/02. Kl. 212	22	I. p.	25 30 19 11,25	„	—	18	—	o. B.	M. 3000, leicht asph., lebt	—
						28			M. 3100	

Kl. 465	26	I. p.	17 11,25 23,5 25 18 11	"	vorz.	6	—	"	lebt K. 3870, K. U. 36. Druckmarken auf beiden Schetelbeinen. Lebt	—
62. 01/02. Kl. 460										
63. 00/01. Kl. 436	20	I. p.	24 29 20 11,5	II. Schl.	knstl.	18 ¹ / ₂	—	Tag 6: 39,60, " 7: 38,60, " 8: 38,40. Damm norm., Emp- findlichkeit des Hypo- gastriums	M. 3140, lebt	—
64. 00/01. Kl. 433	27	I. p.	20,25 25 18 11,5	I. Schl.	vorz.	10 ¹ / ₄	—	o. B.	M. 3530, lebt	—
65. 00/01. Kl. 405	22	I. p.	21 25 18 11	"	—	14 ¹ / ₂	—	"	M. 2570, lebt	—
66. 00/01. Kl. 377	25	I. p.	22,5 27,5 18,5 11-11,5	"	—	10 ³ / ₄	—	afebril, vom 3. Tage riechende Lochien	K. 3060, lebt	—
67. 00/01. Kl. 359	24	I. p.	24 25,5 19 10,75	"	vorz.	15 ¹ / ₄	—	o. B.	K. 3600, lebt	Kleiner Riss in Damm und Klitoris.
68. 00/01. Kl. 357	24	I. p.	22 24,5 16,5 17 d. 10,5-11 *V. 8,75-8,5	II. Schl.	—	21 ¹ / ₂	—	"	M. 3230, lebt	Leichter Dammriss.
69. 01/02. Kl. 290	21	I. p.	21,5 25,5 17 11	"	—	11 ³ / ₄	—	"	K. 2340, nicht ganz reif; lebt	Leichter Dammriss.
70. 01/02. Kl. 191	21	I. p.	22 24,5 17,5 10,5-11	I. Schl.	—	14 ¹ / ₄	—	"	K. 3550, lebt	—

Lfd. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
71. 01/02. Kl. 163	20	I. p.	22 24 17,5 11	I. Schl.	vorz.	13 ¹ / ₄	Kompress. d. Nabelschnur zwischen Arm und Rumpf	Tag 5: 38,2°	K. 2820, K. U. 36, mässig asph., lebt	—
72. 01/02. Kl. 156	23	I. p.	25 27 18,5 11,5	II. Schl.	—	10 ¹ / ₄	Nbschnschl.	o. B.	K. 3600, L. 54, leicht asph., lebt	In d. rechten Schläfen- gegend Druckstelle v. Promontorium.
73. 01/02. Kl. 198	26	I. p.	25 27 17,5 11	I. Schl.	—	20 ¹ / ₄	—	"	M. 2830, leicht asph., lebt	Dammizision. Adnexe rechts, bei Entlassung leicht druckempfindlich.
74. 00/01. Kl. 164	23	I. p.	23 25,5 17 11	"	—	16 ¹ / ₄	—	"	M. 2720, lebt	—
75. 00/01. Kl. 374	28	I. p.	22 26 17 11,5	II. Schl.	—	9 ¹ / ₂	—	"	K. 3080, lebt	—
76. 00/01. Kl. 280	21	I. p.	22 26 18 11	I. Schl.	—	6	—	"	M. 2920, leicht asph., lebt	—
77. 00/01. Kl. 200	24	I. p.	30 31 18,5 11,5	II. Schl.	vorz.	36	—	"	K. 3320, asph., Druck- marken am rechten Ohre, lebt	—
78. 00/01. Kl. 209	21	I. p.	26,5 28,5 18,5 11 *V. 9,5	Schl.	"	6 ¹ / ₄	—	"	M. 3740, leicht, Druck- marken, lebt	—

81. 00/01. Kl. 5	28	I. p.	23 25 20 11	I. Schl.	—	12	—	—	lebt	—
82. 00/01. Kl. 33	29	I. p.	25 27,5 18 11,5	—	vorz.	33 ³ / ₄	—	—	K. 3485, K. U. 38. Exkoriationen am linken Scheitelbein, lebt	Sehr heftige atonische Nachblutung.
83. 01/02. Kl. 155	18	I. p.	d, 11	—	—	13 ¹ / ₄	—	—	M. 2630, lebt	Mediane Damm- inzision
84. 01/02. Kl. 213	19	I. p.	24 26,5 17,5 11	II. Schl.	—	9 ¹ / ₂	—	—	K. 2970. Schädel lang ausgezogen; am rechten Scheitelbein leichte Druck- marken; völlig lebensfrisch	—
85. 01/02. Kl. 117	21	I. p.	21 25,5 17 11-11,5	—	—	5 ¹ / ₂	—	—	M. 2450, lebt	—
86. 01/02. Kl. 108	19	I. p.	21 24 17 11	I. Schl.	vorz.	15	—	—	K. 3086, lebt	Bei Entlassung linke Adnexe leicht druck- empfindlich.
87. 01/02. Kl. 70	22	I. p.	22 24,5 18 11,5	II. Schl.	—	9 ¹ / ₂	—	—	K. 3050, etwas asph., lebt	—
88. 01/02. Kl. 64	21	I. p.	22 24 17 11	—	—	26	—	Tag 4: 37,8 ⁰ , Schrunden	K. 3000, lebt	—
89. 01/02. Kl. 225	22	I. p.	23 25 17 11,5	I. Schl.	—	29	—	1mal 37,8 ⁰ Schrunden	M. 3100, lebt	—
90. 01/02. Kl. 212	22	I. p.	25 30 19 11,25	—	—	9 ³ / ₄	Doppelte Nbschmschl.	o. B.	M. 3000, leicht asph., lebt	—

Lfd. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
91. 01/02. Kl. 227	23	I. p.	24 25 16,5 10,5-11	I. Schl.	—	30	Einfache Nbschnschl.	Tag 5: 38,2°	M. 3120, leicht asph., lebt	Dammnizision, Klitoris-Scheidenriss.
92. 00/01. Kl. 98	21	I. p.	24 27 17 11	"	vorz.	25	—	o. B.	M. 2920, lebt	—
93. 00/01. Kl. 522	18	I. p.	21 25 17 11	"	—	25 1/4	—	"	M. 2930, lebt	—
94. 00/01. Kl. 488	32	I. p.	25 30 20 11,5	"	schr vorz.	36 3/4	—	"	K. 3330, lebensfrisch	Sehr langsame Er- weiterung des Mutter- mundes, 3 Inzisionen.
95. 00/01. Kl. 487	23	I. p.	23 27,5 17,5 11	II. Schl.	—	36	—	"	2930, K.U. 37, lebt	—
96. 00/01. Kl. 477	23	I. p.	20 26 17 11,5	I. Schl.	—	22 1/4	—	"	K. 2870, lebt	—
97. 02/03. Kl. 146	30	I. p.	24 27 18 11,5	"	—	20	—	afebril; aber riechende Lochien	K. 3000, lebt	—
98. 02/03. Kl. 177	22	I. p.	22,5 25 18 11,5	"	—	7	—	o. B.	K. 3310, lebt	—
99. 02/03. Kl. 192	27	I. p.	21 24 16,5 10,75-11	II. Schl.	—	21	—	"	K. 2520, lebt	—
100. 02/03. Kl. 199	—	I. p.	21,5 24 16 10,5-11	I. Schl.	—	17 3/4	—	"	K. 2640, lebt	—
101. 02/03. Kl. 202	30	I. p.	24 27 17,5 10,5-11	"	—	38	—	"	K. 2800, lebt	—

KL. 626	I. p.	21	24	11,25	II. Schl.	—	18	—	febril wegen Lungenkomplikation	lebt	—
104. 02/03. KL. 622		21	27,5 d 11							K. 2440, lebt	
105. 02/03. KL. 613	I. p.	21	25,25 19 11,5		I. Schl.	—	4 1/2	—	o. B.	M. 3510, lebt	Leichter Scheiden- dammriss.
106. 02/03. KL. 577	I. p.	23,5 27 17,75 11,25			"	—	16 3/4	—	"	K. 3290, lebt	—
107. 02/03. KL. 565	I. p.	23 27,5 19 11,25			"	—	16	—	"	M. 2900, lebt	—
108. 02/03. KL. 556	I. p.	26,5 29 20 11,5			II. Schl.	—	16	—	"	K. 2140, lebt	—
109. 02/03. KL. 550	I. p.	25,5 28,5 18,5 11,5			I. Schl.	—	14 1/2	—	"	M. 3050, lebt	—
110. 02/03. KL. 463	I. p.	23 26 18 11			"	—	6 1/4	—	"	K. 2650, lebt	—
111. 01/02. KL. 488	I. p.	22 25,5 19 11			"	—	12 1/4	—	In den ersten Tagen febril	M. 3570, leicht asph., nach 6 Tagen eigenartige Krampfanf.	Dammriss.
112. 01/02. KL. 554	I. p.	23 26 17,5-18 11			"	—	19 1/2	—	o. B.	M. 3520, + nach einem Tage. Sehr starke Blutung in den Lungen Hypertrophie des rechten Ventrikels. Offenbleiben des Duktus Botalli.	—
113. 01/02. KL. 620	I. p.	23,5 25 17 11,5			II. Schl.	vorz.	11	—	"	K. 3250, lebt	Scheidendammriss.

Lfd. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
114. 01/02. Kl. 629	20	I. p.	24 28 19 11,5	I. Schl.	knstl.	29	—	o. B.	M. 2600, lebt	—
115. 02/03. Kl. 28	22	I. p.	22 26 17,5 11-11,5	"	—	10 ¹ / ₂	—	"	K. 2410, lebt	—
116. 02/03. Kl. 60	21	I. p.	16,5 11	"	—	11	—	Tag 5-8: 38-39 °, Riechende Lochien	K. 3470, lebt	—
117. 02/03. Kl. 85	28	I. p.	22 26 17 11	II. Schl.	—	43 ³ / ₄	Einfache Nbschnschl.	Tag 5: 38,20 " 6 } 38° " 7 } Riechende Lochien	K. 3760, lebt	Walchorsche Hänge- lage.
118. 01/02. Kl. 402	26	I. p.	24 26,5 19 11,5	I. Stl.	—	8	—	o. B.	M. 2920, lebt	Kleiner Dammriss.
119. 02/03. Kl. 341	18	I. p.	d. 11	II. Stl.	—	5 ³ / ₄	—	"	M. 2800, leicht asph., lebt	Lösung des linken Armes. Veit-Smellie.
120. 02/03. Kl. 615	20	I. p.	24,5 28 19 11,5	"	—	28 ¹ / ₄	—	"	M. 3270, lebensfrisch	Veit-Smellie.
121. 02/03. Kl. 334	21	I. p.	d. 10,75	I. Schl.	—	67	—	Fieber bis 39° d. ersten 10 Tage. Damm- nähte schnelden durch. Wunde schmierig belegt. Diphtherie.	M. 4150, K U. 38,5, L. 55, bleich asph., lebt	Walchorsche Hänge- lage. Scheidendammiss.

Operativ beendigte Geburten.

1. Zange.

123. 00/01. Kl. 415	25	I. p.	20 15	22 11	I. Schl.	—	50	Stark. Dehnung des unteren Uterinsegment. Stillstand der Geburt	o. B.	M. 2700, lebt	Dammriss.
124. 02/03. Kl. 444	21	I p.	24 18	27 10,5-11	II. tiefer Quer- stand	—	19 ¹ / ₂	Schüttelfrost intra partum; T. über 40°. Puls schwach. Stink. Ausfluss. Schwanken der Herztöne. Nephritis.	—	M. 2970, nur leicht asphyktisch, lebt	Nach der Zange äusserst schwere atonisch. Blutung. Crédé. Trotz Kochsalz- infusion und Exzitantien nach 5 ¹ / ₂ Stunden Exitus. Sektion: Starke Anämie sämtlicher Organe.
125. 02/03. Kl. 421	22	I. p.	22 18	27 11	I. Schl.	—	41	Schwanken d. Herztöne, Mekonium- abgang	Tag 4: 37,7°	K. 3340, Schädel stark konfiguriert. Schlauff asph. Fazialisparese. Lebt.	Walchersche Hänge- lage. Scheiden- Frenulumriss.
126. 01/02. P. 164	40	I. p.	25 17,5	29 11,25	"	vorz.	—	Herztöne dauernd über 180	—	M., K. U. 32,5, leicht asph.	Dammrinision.

2. Perforation.

127. 01/02. Kl. 477	29	I. p.	d. 11,5	—	I. Schl.	—	39 ¹ / ₄	Hinter- scheitelbein- einstellung, Kontrak- tionsring fast in Nabel- höhe, sehr grosses Kind	Tag 1-3 blutiger Urin. Tag 5-12: 38°. Damm- riss nicht geheilt	Knabe ohne Beleg- knochen, Hirn und Blut: 4000	Wendungsversuche scheitern an der Grösse des Kindes und der über- mässigen Cervixdehnung. Da letzterem jeder Wehe zunimmt: Perforation des geschädigten Kindes. Kranioklasie, Kieftotomie, Exartikulation d. rechten Armes. Dammriss 11°.
------------------------	----	-------	---------	---	----------	---	--------------------------------	---	---	--	--

Lfd. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
3. Sectio caesarea.										
128. 01/02. Gyn. J.-No. 91	18	I. p.	24 26 19 11	Schl.	—	8 $\frac{1}{2}$	Schwere Eklampsie intra p.	Mutter + an Eklampsie	M. 2800, leicht asph., lebt	Konservativ.
129. 00/01. KL 426	18 $\frac{1}{2}$	I. p.	Vera 9	II. Schl.	—	—	Schwere Eklampsie in der 36. Woche	Mutter + an Eklampsie. Grosse weisse Niere	K. 2100, tief asph., lebt	Konservativ.

II. Mehrggebärende.

Spontangeburt.

130. 01/02. KL 228	26	III. p.	26 28 20 11,5	I. Schl.	—	20 $\frac{3}{4}$	—	O. B.	M. 3150, lebt	—
131. 00/02. KL 435	31	II. p. P. 1 spontan	24 30 18 11,5	"	—	4	—	"	K. 3650, L. 52, lebt	—
132. 00/01. KL 362	31	IV. p. P. 1—3 spontan	21 24 19 11	"	—	20 $\frac{1}{4}$	—	"	M. 3280, lebt	—
133. 01/02. KL 167	37	X. p. 1 > Frühgeburt † nach 6 Stunden, sonst normale Geburten	24 27 18 11,25	II. Schl.	—	5 $\frac{3}{4}$	—	"	K. 3070, lebt	—
134. 01/02. KL 140	31	III. p. P. 1 lange dauernd, lebt, P. 2 Frühgeburt im 7. Monat, 24 Std. dauernd,	25 27 19 11,25—11,5	"	—	13 $\frac{1}{2}$	—	"	M. 2400, lebt	—

135. 01/02. Kl. 132	25	II. p. P. 1 Frühgeburt im 8. Monat, lebt	20 17	23 14,5	I. Schl.	—	14 ³ / ₄	—	Tag 9 u. 10. 38°. Leichte Empfind- lichkeit der Adnex- gegend	—	M. 1020, L. 44, K. U. 30, lebensfrisch, nicht ganz reif	Dammriss.
136. 00/01. Kl. 311	24	II. p. P. 1 Zange, † nach 8 Monaten	20 18	25 11	"	—	21 ¹ / ₄	—	O. B.	—	K. 3270, lebt	—
137. 00/01. Kl. 20	26	II. p. P. 1 spontan, 16 Stunden	22 19	25 10,5 *V. 9,25-9,5	"	—	7 ³ / ₄	—	"	—	K. 3260, lebt	—
138. 00/01. Kl. 391	25	II. p. P. 1 Frühgeburt im 9. Monat, lebt	25 18	29 11	"	vorz.	24 ¹ / ₄	—	"	—	K. 2730, leicht asph., lebt	—
139. 00/01. Kl. 392	40	IV. p. P. 1 spontan, lange dauernd, lebt, P. 2 spontan, lange dauernd, † bald p.p. P. 3 Kind † bald p.p.	23 17	26 11	II. Schl.	—	6	—	"	—	M. 2900, Druck- marken, lebt	—
140. 00/01. Kl. 400	21	III. p. P. 1—2 leicht	22 16	26 11	"	—	3	—	"	—	K. 3120, lebt	—
141. 00/01. Kl. 378	31	II. p. P. 1 spontan	24 19	29 11,5	"	—	5 ¹ / ₄	—	"	—	M. 3020, lebt	—
142. 00/01. Kl. 337	31	X. p. alle Geburten schwer	d. 11		Schl.	—	—	—	"	—	M. 2750, lebt	—
143. 00/01. Kl. 290	22	IV. p.	22 18	27 11	I. Schl.	—	15 ¹ / ₄	—	"	—	M. 3650, lebt	—
144. 00/01. Kl. 285	29	II. p. P. 1 Kind lebt	d. 11,5		II. Schl.	vorz.	14 ³ / ₄	Vorfall der Nabelschnur	"	—	M. 3750, asph., lebt	Reposition.

Lfd. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
145. 00/01. Kl. 104	40	V. p. P. 1—2 Zange P. 3—4 spontan	23 26 16 11	I. Schl.	knstl.	9	—	o. B.	M. 2700, lebt	—
146. 00/01. Kl. 42	24	II. p. P. 1 Querlage, † intra part.	23 26 17 11	II. Schl.	—	36 ³ / ₄	—	"	M. 2780, lebt	—
147. 00/01. Kl. 403	27	II. p. P. 1 sehr schwer, spontan, 26 Std.	20 25 19 11	I. Schl.	vorz.	8 ¹ / ₂	—	afebril. Riechende Lochien	K. 3480. K. U. 37, tiefe Impression in der linken Schläfe, † nach 2 Tagen	—
148. 01/02. Kl. 394	25	II. p.	22 24,5 16,5 10,5-11	II. Schl.	—	—	—	o. B.	K. 305 ¹ , Druckmark., lebt	—
149. 01/02. Kl. 391	36	XIV. p. P. 1 Zange P. 2 Frühgeburt P. 3 Abort P. 4—13 spontan	23 25,0 16,5 11	I. Schl.	—	13	—	"	K. 3800, lebt	Dammriss.
150. 01/02. Kl. 115	—	II. p. P. 1 normal	22,5 25 17 10,5-11	II. Schl.	—	4 ³ / ₄	—	"	M. 2850, lebt	—
151. 01/02. Kl. 87	26	II. p. P. 1 schwer, 46 Std.	24 27 17,5 10,5-11	I. Schl.	—	5	—	"	K. 2850, lebt	—
152. 01/02. Kl. 44	39	VI. p. P. 1—5 normal	24,5 27 19 11	II. Schl.	—	10 ³ / ₄	—	"	K. 3090, K. U. 37, lebt	Bei Entlassung linke Adnexe leicht druck-

Kl.	Jahr	Beschreibung	Alter	Geschlecht	Art der Geburt	Zeitpunkt	Ort	Lebensdauer
106. 04/02. Kl. 12	—	P. 1 schwer, † angeblich an „Brand“	17	11,5	I. Schl.	—	9 ⁸ / ₄	—
154. 01/02. Kl. 228	26	III. p. P. 1—2 normal	26 20	28 11,5	I. Schl.	—	9 ⁸ / ₄	M. 3150, lebt
155. 01/02. Kl. 234	22	II. p. P. 1 Abort	Vera 9	—	II. Schl.	—	24	K. 3540, lebensfrisch
156. 01/02 Kl. 542	38	X. P. P. 1—7 und P. 9 spontan, P. 8 Querlage, Wendung und Extraktion	27 21	30 11,5	„	—	6	K. 2800, lebt
157. 01/02. Kl. 540	—	II. p. P. 1 normal	20 17,5	25 11	„	—	5 ⁸ / ₄	K. 3300, lebt
158. 00/01. Kl. 92	26	III. p. P. 1 und 2 spontan und schnell	22 17	26 11	I. Schl.	—	19 ¹ / ₄	K. 2720, lebt
159. 00/01. Kl. 614	29	II. p. P. 1 spontan, 2 Std.	24 18,5	26,5 11,5	II. Schl.	—	16 ¹ / ₄	M. 3220, lebt
160. 00/01. Kl. 544	22	IV. p. P. 1 und 3 Zange, P. 2 Abort	25,5 d. 11	28,5 11	I. Schl.	—	4 ¹ / ₂	M. 330, lebt
161. 00/01. Kl. 503	38	VII. p. Lues, spontan, Kind 5 und 6 leben	23 17,5	26 11	II. Schl.	—	10	K. 2600, nicht asph.
162. 00/01. Kl. 478	18	II. p.	23,5 18	27 11	I. Schl.	—	4 ³ / ₄	K. 3130, lebt
163. 00/01. Kl. 471	29	III. p. P. 1 { normal P. 2 {	22 18	26,5 11,5	„	—	29 ¹ / ₂	M. 2950, lebt

Lfd. No. Jahrgang Journal	Altg.	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
164. 00/01. Kl. 466	25	II. p. P. 1 spontan	23 27 16,5 11,5	II. Schl.	vorz.	3 ³ / ₄	—	o. B.	K. 3650, lebt	—
165. 02/03. Kl. 109	26	II. p. P. 1 spontan, Kind + nach 9 Wochen an Krämpfen	26,5 29 19 10,5-11	"	"	28	—	"	K. 4200, L. 54, K. U. 38, tiefe Druck- marke an der recht. Schläfe, weniger tief auch links	—
166. 02/03. Kl. 111	24	II. p.	23 26 18 10,5-11	I. Schl.	—	6 ¹ / ₃	—	"	K. 2630, lebt	—
167. 01/02. Kl. 122	37	V. p. P. 1 grosses Kind, spontan, 3 Tage dauernd, lebt. P. 2 dto. P. 3 Abort. P. 4 Kind + nach 5 Monaten angebl. an Hirnhautentz. Mutter seit dieser Geburt Husten u. Auswurf	22 26,5 17 11-11,5	"	—	—	—	o. B. Mutter stirbt nach zwei Monaten an Phthise	K. 2200, lebensfrisch	—
168. 02/03. Kl. 137	21	II. p. P. 1 spontan	21 24 18 10,75	"	—	5 ³ / ₄	—	afcbril, riechende Lochien	K. 3020, nicht asph.	—
169. 02/03. Kl. 156	34	II. p. P. 1 normal	22 25 17 11	"	—	3	—	o. B.	K. 3200, lebt	—
170. 02/03. Kl. 156	24	II. p.	22 25	"	—	7	—	"	K. 3510.	—

Kl. 200	F. 1 { P. 2 }	13,5 14	II. Schl.	—	38	—	neuer Lochien	lebt
172. 02/03. Kl. 211	33 VI. p. Normale Geburten	26 29 18 11,5	II. Schl.	—	38	—	O. B.	M. 3710, lebt
173. 02/03. Kl. 257	20 II. p. P. 1 6 Wochen zu früh	25 27,5 18 11	I. Schl.	—	10 1/2	—	"	K. 2170, nicht völlig reif, lebt
174. 02/03. Kl. 221	23 II. p.	27,5 30,5 18,5 11	"	—	40	—	Tag 7: 40°, sonst normal	K. 3000, lebt
175. 02/03. Kl. 217	25 II. p. P. 1 spontan, Kind lebt	22 25,5 19 11	II. Schl.	—	5 3/4	—	O. B.	2500, lebt
176. 02/03. Kl. 317	20 II. p. P. 1 normal	d. 11	"	—	6 1/2	—	"	K. 3300, lebt
177. 02/03. Kl. 350	31 III. p. P. 1 Zange P. 2 spontan	d. 10,5 — 11	I. Schl.	—	10 3/4	—	"	M. 3070, lebt
178. 02/03. Kl. 600	30 II. p. P. 1 Steisslage, Extraktion, Dauer 16 1/2 Std. M. 2700. Wochenbett febril	23 26,5 17,5 11	"	—	16 1/2	—	Tag 4: 38,2°, Schrunden	M. 3000, lebt
179. 02/03. Kl. 651	31 IV. p. P. 1 — 3 normal	25 27,5 18 11,5	II. Schl.	—	3 3/4	—	O. B.	K. 3030, lebt
180. 02/03. Kl. 643	30 II. p. P. 1 normal	22 27 17 11	"	—	17	—	"	K. 3300, lebt
181. 02/03. Kl. 641	22 II. p. P. 1 normal	23 27 17,75 10,75	I. Schl.	—	21 1/2	—	"	K. 2830, lebt

Lide. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
182. 02/03. Kl. 606	32	III. p.	21 27 19 11,5	I. Schl.	—	7 1/2	—	o. B.	K. 3100, leicht asph., lebt	—
183. 02/03. Kl. 553	22	III. p. P. 1 } schnell P. 2 }	25 28,75 18,75 11,5	"	—	23 3/4	—	"	M. 3350, lebt	—
184. 02/03. Kl. 551	26	II. p. P. 1 normal, Kind +	23,5 26 17 11,5	II. Schl.	—	39	—	"	K. 3220, K. U. 38, lebt	—
185. 02/03. Kl. 540	40	XI. p. 2 > abortiert, sonst normal geboren	22,5 26 17 11,5	I. Schl.	—	24	—	"	K. 3550, lebt	—
186. 02/03. Kl. 489	30	III. p. P. 1 Zange, schwer, manuelle Plazentariösung, P. 2 Zange, beide Kinder leben	26 29 20 11,5	II. Schl.	—	3 1/4	—	"	K. 3190, leicht asph., lebt	—
187. 01/02. Kl. 492	27	II. p. P. 1 spontan	23 28 17 11	I. Schl.	—	10	—	"	K. 3600, lebt	—
188. 01/02. Kl. 475	24	II. p. P. 1 spontan	21,5 24 17 11,5	II. Schl.	—	4 1/2	Nbschnschl.	"	K. 3720, K. U. 38, leicht asph., lebt	—
189. 01/02. Kl. 558	24	II. p. P. 1 normal	21,5 24 18 11,5	"	—	18 1/4	—	"	K. 3000, lebensfrisch	—
190. 01/02. Kl. 563	26	II. p. P. 1 normal	24 28 18,5 11	I. Schl.	—	7 3/4	—	"	M. 3450, K. U. 38, lebt	—
191. 01/02. Kl. 571	24	II. p.	20 25,5 17 11,5	"	—	5	—	"	K. 2900, lebt	—

Kl. 44	P. 1 spontan	19 11—11,5						lebt	
193. 02/03. Kl. 56	III. p. P. 1 } spontan P. 2 }	23 25 18 11	"	12 ³ / ₄	—	"	K. 3080, lebt	—	
194. 02/03. Kl. 64	III. p. P. 1 } normal P. 2 }	25 28 19,5 11,5	"	5	—	afebril, Schrunden der Brüste	K. 3350, lebt	—	
195. 02/03 Kl. 69	II. p. P. 1 spontan	22 26 17-17,5 11	II. Schl.	6 ¹ / ₄	—	o. B.	K. 3200, lebt	—	
196. 02/03. Kl. 73	II. p. P. 1 spontan	24 27,5 18 11,5	II. Vorder- hauptslage	28	—	afebril. Tag 3—7: riechende Lochien	M 2850, lebt	Expressio placentae wegen mässiger Blutung.	
197. 01/02. Kl. 46	II. p.	23,5 27 18 11,5	I. Steiss- lage	1 ³ / ₄	—	o. B.	M. 2300, K. U. 33, lebensfrisch, nicht ganz aus- getragen, linkes Scheitelbein abgeflacht	—	
198. 02/03. P. 80	IX. p. Geburten dauerten immer sehr lange; 4 Kinder † gleich p. p.	d. 11	I. Schl.	—	—	"	Kind leicht asph., lebt	Walchersche Hänge- lage.	
199. 00/01. P. 485	II. p.	ext. 19 d. 11,5	II. Schl.	38	—	Schwanken der Herzöne, Meconium- abgang	Kind über- tragen, leicht asph.	Spontan.	
200. 00/01. P. 198	IV. p. P. 1 spontan, † intra part. P. 2 spontan, † nach 14 Woch. P. 3 Frühgeburt, † nach 2 Std.	26 26 18 11	I. Schl.	27	knstl.	Vorfall der Nabelschnur	Kind lebt	Impression nach Hofmeter.	

Lfd. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
201. 00/01. P. 135	28	V. p. P. 1 Perforation, P. 2 Symphyseo- tomie (von Schatz), P. 3 Abort, P. 4 spontan	d. 10—10,5 *V. 9,0	II. Schl.	—	—	—	—	Kind lebt	—
202. 00/01. P. 318	32	VI. p. Frühere Geburten spontan	23,5 28 d. 19 *V. 9,5	I. Schl.	—	—	Vorfall der Nabelschnur	—	Kind leicht asph.	Reposition der Nabel- schnur, Impression nach Hofmeier.
203. 01/02. P. 624	36	XIV. p. 1 > Querlage, sonst waren die Geburten normal, etwas schwer	24 28 19 11	II. Schl.	vorz.	—	Mekonium- abgang	—	M. 3000, lebt	—
204. 02/03. P. 377	30	V. p. P. 1—4 spontan	d. 11	I. Schl.	—	—	Vorfall der Nabelschnur	n. B.	Kind 4000, lebt	—
205. 02/03. P. 653	30	VI. p. P. 1 Perforation nach 2 täg. Dauer, P. 2 Wendung und Extraktion, Kind + P. 3 Zange, Kind + nach einigen Std. P. 4 Wendung und Extraktion, Kind + P. 5 Kind spon- tan +	d. 11	"	kunstl.	—	—	—	Kind 4000, 8 Tage über- tragen, lebensfrisch, Kopf stark konfiguriert; breite Druck- marken in der linken Schläfe	—

1. Typische Zange.

206. 01/02. 22 Kl. 658	II. p. P. 1 Zange, Kind lebt	23,5 27 19 11-11,5	II. Schl.	—	5 ³ / ₄	Sinken der Herztöne	Mehrmals 38-39, Schrunden, Bronchitis	M. 3700, leicht asph., lebt	Scheiden-Dammriss. Expressio plac. wegen Blutung.
---------------------------	------------------------------------	-----------------------	-----------	---	-------------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	---

2. Hohe Zange.

207. 00/01. 19 Kl. 408	II. p. P. 1 schwer, Dauer 48 Std., Kind tief asph., † nach 8 Std.	23 25 17 11	II. Schl.	vorz.	22 ¹ / ₂	Drohende Asphyxie des Kindes	O. B.	K. 3350, doppelte Nbschnschl. tief asph., lebt	Von der Wendung wurde bei dem schon schwer ge- schädigten Kinde Abstand genommen. Hofmeiers Impression misslang. — Aton. Nachblutung.
208. 01/02. 28 Kl. 126	II. p. P. 1 normal	22,75 27 17,5 10,75	"	—	23	Schwanken der Herztöne	Tag 2 u. 3: 37,8, Schrunden	M. 3750, L. 54, lebt	Dammriss.

3. Extraktion bei Beckenendlage.

209. 01/02. 35 Kl. 588	III. p. P. 1 Zange, P. 2 Abort	24 29 19 11	II. Stl.	—	23 ¹ / ₂	Schwanken der Herztöne	O. B.	M. 3970, K. U. 37, lebt	Herunterholen des vorderen Fusses, Ex- traktion, Armlösung, Veit-Smellie.
210. 01/02. 25 Kl. 493	II. p. P. 1 Zange, Kind stirbt ab	23 26 18 11	I. voll- kommene Fusslage	—	5	—	"	lebt	Wiegand - Martin- Winckelscher Handgriff Blasenscheidenstiel.
211. 02/03. 33 P. 28	II. p. P. 1 spontan, Kind lebt	d. 11	I. Stl.	—	—	—	"	Kind ohne Blut und Hirn 4000, Schulter- umfang 44	Kind stirbt mittler- weile ab. Perforation.

4. Wendung und Extraktion.

212. 00/01. 23 P. 249	III. p. P. 1 Frühgeburt, mens. VIII. bald gestorben, P. 2 Abort	d. 10,5-11	I. dorso- postero- riore Querlage	knstl.	—	Schwanken der Herztöne	O. B.	M. 2500, lebensfrisch	Veit-Smellie. Dammriss I°.
--------------------------	---	------------	--	--------	---	---------------------------	-------	--------------------------	-------------------------------

Lfd. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
213. 00/01. P. 282	41	VIII. p. P. 1 Zange, P. 2-4 spontan, P. 5 Wendung, P. 6 Wendung, Kind †, P. 7 Wendung, Schulterbruch, Kind † bald p. p.	d. 10,5—11	I. Schl.	—	—	Hinter- scheitelbein- einstellung. Schwanken d. Herztöne. Mekonium- abgang. Wehen- schwäche	o. B.	Kind 4000, L. 53, K. U. 37, mässig asph., lebt	Veit-Smellie.
214. 00/01. P. 180	40	XV. p 3 × Perforation, 6 × Zange, 2 × Abort, 3 × Wendung und Extraktion; nur zwei Kinder leben, behielten aber infolge Arm- frakturen steife Arme	d. 10,5—11	II. Schl.	vorz.	—	Hinter- scheitelbein- einstellung. Schwanken der Herztöne	"	Knabe schwer asph., riesige Delle am rechten Scheitel- beine des sehr grossen Kopfes, lebt	Wiegand- Martin-Winckelscher Handgriff, sehr schwer.
215. 02/03. P. 54	30	X. p. 2 × Wendung und Extraktion, beide Kinder †, 1 × Achsenzug- zange, 2 × künstliche Frühgeburt,	d. 11—19,5	"	—	—	Placenta praevia	"	M. 2300, † am 3. Tage	Hystereurysc.

Kl. 255	217. 00/01. Kl. 128	29	II. p. zur Welt, P. 2 Kind lebt, P. 3 Kind stirbt nach 1 Jahre	18,5 11	28,5 30 18 11,5	Schl.	—	25 ³ / ₄	Vorfall der schlecht- pulsierenden Nabelschnur	Tag 3-7: 38,5°	K. 3639, †	Scheidendamriss.
218. 02/03. 8. VII. 02. Kl.	32	VII. p. 4 × falsche Lagen; 2 Kinder starben in den ersten Mon.	—	—	d. 10,75	II. Schl.	—	—	Vorfall der Nabelschnur	O. B.	K. 3500, K. U. 36,5, leicht asph., lebt	Impression des nach- folgenden Kopfes ins Becken.
219. 02/03. P. 556	—	VIII. p.	—	—	d. 11,5	I. Schl.	—	—	Stillstand der Geburt, der Kopf erweist sich als kaum konfigura- tionsfähig	„	K. 4100, K. U. 37, klavikulär- fraktur, Hume- rusfraktur links, Druckmarke auf linkem Schenkelbein, bleich asph., lebt	Es bedarf eines ge- waltigen Kraftauf- wandes, um den nach- folgenden Kopf ins Becken zu drücken.
220. 02/03. P. 652	34	VI. p.	—	—	d. 11	„	vorz.	—	Mässige Dauer- kontraktion d. Uterus; unteres Uterinsegment hochgradig verdünnt; Kopf nicht konfigu- rationsfähig. Stillst.d. Geburt	O. B.	K. 4000, lebt	Armlösung. Die Impression des Kopfes ins Becken ge- lingt nur auf äusserst starken Druck und Zug.
221. 01/02 Kl. 489	28	III. p. P. 1 Frühgeburt, m. VIII. 2 Tage dauernd, P. 2-drei Wochen übertragen	—	—	23,5 27 18,5 10,5 *V. 9,25 (Zirkel)	„	knstl.	6 ¹ / ₂	—	„	M. 2940, bleich asph., erholt sich in den nächsten Tagen	Kind eine Woche über- tragen. Einleitung der Ge- burt durch Hystereuryse mit Hinblick auf das über- tragene Kind der zweiten Geburt und das enge Becken. Veit-Smellie.

Lfd. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
222. 02/03. Kl. 65	37	XIV. p. P. 1 spontan, P. 2 - 13 mit Kunst- hilfe; nur 2 Kinder leben; die übrigen † bald p. p.	25 27.5 18,5 10.5-11	I. Schl.	—	32 1/2	Hinter- scheidenbeim- einstellung	o. B.	K. ohne Hirn 3640, L. 55, †	Hystereuryse. Während der Wen- dung stirbt das Kind ab. Perforation und Extraktion.
5. Künstliche Frühgeburt.										
223. 01/02. Kl. 547	27	II. p. P. 1 normal	25 27 18 11 *V. 9,5 (Zirkel)	II. Schl.	—	4 1/2	Polyarthr. rheum. Vit. cordis	Tag 3: 39,4° Adnex. bds. schmerz- haft. Komplikat. m. Polyarth. rheum.	M. 2600, lebensfrisch	37.-38. Woche. Spontan.
224. 01/02. Kl. 335	25	II. p. P. 1 Perforation von seiten der Poliklinik	22,5 24,5 17,5 10.5-10.75 *V. 9 9,25	II. Quer- lage, dann I. voll- kommene Fusslage	—	21 1/2	—	o. B.	M. 2370, asph., lebt	37. Woche. Extraktion. Dammriss.
225. 01/02. Kl. 457	29	II. p. P. 1 spontan, 3 Tage dauernd, Kind lebt	21,5 25,5 17,5 10 *V. 9	I. Schl., dann II. dorso- anteriore Querlage	knstl.	36 3/4	Vorfall der Nabelschnur nach Blasen- sprengung	"	K. 1970, schwer asph., am 5. Tage Parotitis abscedens, lebt	37. Woche. Hystereuryse. Nach Geburt des Kindes starke Blutung aus ein. Aste der a. uterina.
226. 01/02. Kl. 194	40	III. p. P. 1 Zange, 65 Std., Kind lebt, P. 2 dfo., 38 Std.	24 27 17,5 9.5-10 *V. 9-8,75 distant. troch. 31. Becken- eingang quer 10-10,5, Beckenausg.	II. dorso- poste- riore Querlage	"	5	—	1 mal 38,2%, sonst o. B.	M. 2790, L. 48, Klavi- kularfraktur links; keine Druckmark., leicht asph., lebt	37. Woche. Hystereuryse. Grösse der Frau 1,44 m. Keine Zeichen von Rachitis.

Kl. 644	P. 1 Perforation, P. 2 Blasen- scheidenfistel	17,5 10,5 *V. 8,75	II. dorso- postero- riore Querlage	—	8 ¹ / ₂	—	—	K. U. 33, schwer asph., † nach 1 ¹ / ₂ Std., Fraktur des os occip., der rechten Humerus- diaphyse und der rechten 7. Rippe; sub- duraler u. sub- arachnoidealer Bluterguss an dem Parietal- und Occipital- lappen, sowie der Medulla oblongata	Martin-Winckelscher Handgriff. Credé. Dammriss.
228. 00/01. Kl. 636	V. p. P. 1 Querlage, Extraktion, †, P. 2 Abort, P. 3 Querlage, während der Extraktion †, P. 4 Perforation	23 28 10,5—11 *V. 9 (Zirkel)	II. dorso- antere Querlage	—	—	—	—	M. 2440, Diameter bipariet. 10,5, A. U. 34, † nach 1 Std. Schädel- basisfraktur: Grosser Blut- erguss. Fraktur der rechten Humerus- diaphyse	Einleitung der Geburt durch Hystereuryse. Wendung und Extrak- tion. Impression des nachfolgenden Kopfes. Expressio plac. wegen Blutung. Dammriss II°.
229. 02/03. Kl. 20	II. p. P. 1 Kind aus- getragen, Perforation seitens der Poliklinik	23,5 27,5 18 10,5 *V. 9,5	I. Schl. dann II. dorso- postero- riore Querlage	knstl.	56	—	—	M. 2750, bds. am Schädel Druck- marken, lebt	36. Woche. Hyster- euryse. Äussere Wen- dung auf den Kopf. Walchersche Hänge- lage. Hofmeiers Im- pression.

6. Perforation.

230. 00/01. Kl. 411	II. p. P. 1 spontan, Kind lebt	24 27,5 17 10,75	II. Schl.	vorz.	19 ¹ / ₂	Hochstand des Kontraktions- ringes, Vorzeitige Placentar- lösung	Die ersten 14 Tage Tempera- turen bis 38°	K. 3060, L. 52	Kind war schon vor der Perforation ab- gestorben.
------------------------	--------------------------------------	---------------------	-----------	-------	--------------------------------	---	---	-------------------	---

Lfd. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
231. 02/03. Kl. 308	39	VII. p. 3 Aborte, 1 Frühgeburt, 2 normale Geburten	22,5 30 d. 11	II. Schl.	vorz.	29 ³ / ₄	Hochstand des Kontraktions- ringes, Tetanus uteri, Mutter- mund noch nicht völlig erweitert, Schwanken der Herzöne	o. B.	—	Walchersche Hänge- lage. Impression nach Hofmeier misslingt. Wendung ausge- schlossen. Kind mitt- lerweile abgestorben.
232. 02/03. P. 148	38	VII. p. 5 > spontan, P. 6 Steisslage, bds. Klavikularfraktur	22 25 d. 11	Schl.	—	—	Tetanus uteri	"	Ohne Hirn und Blut, 4000, L. 58	Kind bereits vor der Perforation abgestorben.

7. Laparotomie im Gefolge der Geburt.

	23 18	26 10.5-11	I. Stirn- lage	—	36 ¹ / ₄	Plötzliches Sinken und Verschwinden der 11. Puls der Mutter plötzlich liegend. Ruptura uteri.	Exitus der Mutter nach 10 Std.	K. ohne Blut und Hirn, 3150, L. 57	Perforation und Kranioklasie. Naht des Uterusrisse.
233. 01/02. Kl. 437	30								

8. Sectio caesarea.

	* V. 9	Schl.	—	—	—	Pneumonie im linken Ober- lappen. Nach einem Monat wird Mutter und Kind gesund entlassen	M. 3460. leicht asph. lebt	Die Sectio caesarea wird noch vor Wehen- beginn gemacht.
234. 02/03. Kl. 184	31							

I. Erstgebärende.

Spontangeburt.

235. 02/03. P. 649	20	I. p.	d. 10,5	II. Schl.	—	—	—	† Kind stirbt nach wenig Stunden	—
236. 01/02. Kl. 397	19	I. p.	24 27 17,5 10,5	"	—	8 1/2	—	K. 3200, K. U. 36, lebt	—
237. 02/03. Kl. 133	18	I. p.	22 25 15,5 10	I. Schl.	—	—	—	K. 3400, leicht asph., lebt	—
238. 02/03. Kl. 141	18	I. p.	22,5 25 16,5 10-10,5	"	—	9 1/4	—	K. 3030, lebensfrisch	Walcher.
239. 02/03. Kl. 188	30	I. p.	25 27,5 18 10,5	I. Ge- sichts- lage	—	33	—	M. 2100, lebensfrisch	—
240. 02/03. Kl. 160	24	I. p.	d. 10	I. Schl.	—	—	—	M. 2320	Scheidendammiss.
241. 02/03. Kl. 231	26	I. p.	24 25 17 9,75	"	—	5 1/2	—	K. 3200, leicht asph., † nach 2 Tagen. Sektion wurde nicht gestattet	—
242. 02/03. Kl. 397	23	I. p.	26 29 18,5 10,5	"	—	9 1/4	—	K. 3260, L. 52; tiefe Impression an linker Schläfe	—

Lfd. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
243. 02/03. Kl. 587	29	I. p.	22 25 17,5 10	Schl.	—	61	—	Tag 4: 38,2, sonst o. B.	K. 3520, L. 52, K. U. 36, leicht asph.	—
244. 02/03. Kl. 554	20	I. p.	23 25 16 10,5	I. Schl.	—	8	—	—	K. 2980, L. 51. Schädel stark kon- figuriert. Druck- marken bds.	—
245. 02/03. Kl. 539	19	I. p.	20,5 25 17,7 10	"	—	4	—	—	M. 2200, nicht asph., unreif, lebt	—
246. 02/03. Kl. 499	21	I. p.	24 27 17 10	"	—	13	—	—	M. 2160, lebt	—
247. 02/03. Kl. 494	23	I. p.	21 26 18 10,5	"	—	8 $\frac{1}{2}$	—	Tag 4: 37,8	M. 3140, lebt	—
248. 00/01. Kl. 78	35	I. p.	26 28 17 10,5	"	vorz.	45	—	—	M. 2700, lebt	—
249. 00/01. Kl. 481	18	I. p.	19,5 24 15,5 10,5	"	—	19 $\frac{3}{4}$	—	—	M. 2500, lebt	—
250. 00/01. Kl. 427	20	I. p.	20,5 23,5 17,5 10,5	"	—	24	—	—	K. 3650, K. U. 37	Dammriss II°.
251. 01/02. Kl. 92	30	I. p.	24,5 25,5 16 10	II. Schl.	—	9 $\frac{3}{4}$	—	—	M. 2820, asph., + nach	—

252. Kl. 612	17	10,5	I. Schl.	—	10 ³ / ₄	—	"	K. 3950, K. U. 37,5, nicht asph., lebt	Dammriss II°.
253 01/02. Kl. 483	20	24 19	27 10,5	I. Schl.	—	10 ³ / ₄	—	K. 3800, K. U. 37, leicht asph., lebt	—
254. 01/02. Kl. 520	18	23 19	25,5 10,5	I. Schl.	—	4 ³ / ₄	Meconium- abgang	Tag 6: 38 ⁰ , Tag: 38,4 ⁰ sonst o. B.	—
255. 01/02. Kl. 642	—	20 17,5	25 10,5	"	—	11 ³ / ₄	—	K. 4030, L. 55, K. U. 38, leicht asph., lebt	—
256. 01/02. Kl. 105	30	22 16,5	25 10	II. Schl.	—	—	—	K. 2270	—
257. 01/02. Kl. 113	35	22,5 16,5	25 10,5	I. Schl.	—	25 ¹ / ₄	—	K. 2770	—
258. 01/02. Kl. 124	22	22 18,5	25 10,5	II. Schl.	vorz.	29 ¹ / ₂	—	M. 3400 L. 51	Kleiner Scheiden- dammriss.
259. 01/02. Kl. 662	17	d.	10,5	I. Schl.	vorz.	10	—	M. 3480, schwer asph., lebt	Dammriss II°.
260. 01/02. Kl. 602	23	21,5 15	25,5 10	II. Schl.	knstl.	48 ¹ / ₄	—	M. 2430, leicht asph., Druckmarke auf rechtem Scheitelbein	Walchersche Hänge- lage.

Life. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- borts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
----------------------------------	-------	----------	------------------	-----------------	-------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------	------	-------------

Operativ beendigte Geburten.

1. Hohe Zange.

261. 00/01. Kl. 404	18	I. p.	24 26 18 10	I. Schl.	vorz.	20 ¹ / ₂	Kontrak- tionsring in Nabelhöhe, Schwanken der Herztöne, Meconium- abgang	—	K. 3050, K. U. 37, schreit nach Entfernung d. Schleimes kräftig. Druck- marken	Da wegen der hoch- gradigen Ausziehung des unteren Uteri- segmentes die Wen- dung zu gefährlich ist, hohe Zange. Scheidendammiss.
------------------------	----	-------	----------------	----------	-------	--------------------------------	--	---	---	---

2. Künstliche Frühgeburt.

262. 01/02 Kl. 230	26	I. p.	19 21,5 16,5 10,5	II. Schl.	—	—	—	Tag 2: 38,4° Tag 9: 37,9° Schrunden	K. 2990, lebt	Hystereuryse.
-----------------------	----	-------	----------------------	-----------	---	---	---	---	------------------	---------------

3. Wendung und Extraktion.

263. 02/03. Kl. 145	26	I. p.	24,5 26 17,5 9,5—9,75	II. dorsop. Querlage	—	36 ¹ / ₄	—	Tag 5: 38°	K. 2400, stark asph., lebt	Hystereuryse. Im- pression des Kopfes, Expressio plac. Dammriss II°.
264. 00/01. P. 494	39	I. p.	d. 10	I. Schl.	—	—	—	—	K. †	Der nachfolgende Kopf trifft nicht ein. Kind stirbt ab. Perforation.
265. 00/01 P. 179	31	I. p.	22 26 17 10,5	II. Schl.	—	—	Vorfall der Nabel- schnur, Meconium- abgang	—	M. †, Tiefe Impression der rechten Schläfe	Der nachfolgende Kopf ist auf keine Weise ins Becken zu bringen. Kind stirbt ab. Perfo- ration Dammriss II°

4. Doppelter Handgriff der Siegemundlin.

267. 02/03. Kl. 128	18	I. p.	22 18	24,5 10,5	I. Schl.	—	19 1/2	Hochstand des Kontrak- tionsringes, Schwanken der Herztöne, Meconium- abgang	febril, Cystitis	K. 3570, L. 54, bleich asph., Fraktur der linken Klavikula, lebt	Inzision des Mutter- mundes, totaler Dammriss.
268. 00/01. Kl. 416	27	I. p.	24 16,5	27 10	II. Schl.	—	36 1/2	Hinter- scheitelbein- einstellung	—	M. 2900, schwer asph. Tiefe Im- pressionen am Schädel, lebt	Dammriss.

5. Perforation.

269. 00/01. P. 66	39	I. p.	*Vera 8	II. Schl.	—	—	Vorfall der Nabelschnur und eines Armes	o. B.	L. 52	Kind schon vor Ein- treffen des Arztes ab- gestorb. Perforation.
270. 01/02. P. 261	22	I. p.	23 15,5—16 10—10,5	—	—	—	Vorfall der Nabelschnur, welche schlecht pulsiert	1 > 38°, sonst normal	M. ohne Hirn und Blut über 4500	Beim Wendungsversuche stirbt das Kind ab. Per- foration, Kranioklasse, Cleidotomie rechts, zwei komplette Cervixrisse, rechts 8 cm lang, links 5 cm. Damminzision.
271. 01/02. P. 341	28	I. p.	26 18	28 10	I. Schl.	vorz.	3 Tage	Vorfall der Nabelschnur	—	Nachdem das Kind ab- gestorben ist, Perfo- ration und Impression des Kopfes. Spontan.
272. 01/02. Kl. 400	23	I. p.	24 16,5	27 10	—	—	9 1/4	Vorfall der Nabelschnur	Tag 2 und 3: 38°, sonst normal	Kind war schon vor Eintreffen des Arztes abgestorben.

die Nabelschnur vor,
Kind stirbt ab,
Perforation.

des Kontrak-
tionsringes.
Urin blutig

lage

18 10
infantil

Älde. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
273. 01/02. Kl. 77	32	I. p.	26 28 18 10	I. Schl.	vorz.	17 ³ / ₄	Vorfall der Nabelschnur u. d. rechten Armes, Muttermund nicht erweitert.	—	M. 2370	Inzisionen in d. Mutter- mund haben keine we- sentliche Erweiterung im Gefolge. Kind stirbt ab. Perforation.
274. 00/01. Kl. 117	25	I. p.	d. 10,5	II. Vorder- haupts- lage	—	—	Eklampsie und Febris (38°) intra partum.	o. B.	—	Inzisionen in d. Mutter- mund. Kind abgestor- ben. Perforation und Kranioklasie.

II. MehrgGebärende.

Spontangebürten.

275. 00/01. P. 447	26	IV. p. P. 1 und 3 normal. P. 2 Nabelschnur- vorfall, Versuch der hohen Zange, Perforation	25 28 20 10,5	I. Schl.	—	—	Vorfall der Nabelschn., Vitium cordis, Phthise	—	M. 4000, lebensfrisch, Druck- marken	Reposition.
276. 00/01. P. 344	35	VII. p. P. 1 Kind klein, spontan, P. 2 Frühgeburt, P. 3 Perforation, P. 4 Abort, P. 5 Perforation, P. 6 sehr kleines	d. 10,5	—	—	24	—	—	K. 3000	Walchersche Hänge- lage.

278. 02/03. Kl. 131	20	II. p. P. 1 Zange †	18,5 22 18,5 10,5	II. Schl.	—	7 ³ / ₄	normal	M. 3100, leicht asph.	—
279. 02/03. Kl. 154	26	II. p.	d. 10	Vorder- hauptslage	—	9 ¹ / ₄	o. B.	M. 1900	—
280. 02/03. Kl. 629	35	III. p. P. 1 3Tagedauernd, spontan, Kind lebt, P. 2 spontan	21,5 24,5 18,5 10	II. Schl.	—	63 ¹ / ₂	—	K. 3620, K. U. 36, leicht asph., lebt	—
281. 02/03. Kl. 391	25	III. p. P. 1 und 2 Perforation	24 27,5 15,75 10	"	—	16 ¹ / ₂	Temp. 38°	M. 3150, leichte Druck- marken	Walchersche Hänge- lage.
282. 02/03. Kl. 201	26	II. p. P. 1 schwer	26 30 18 10,5	I. Schl.	—	8 ³ / ₄	—	M. 2920, leicht asph., lebt	—
283. 01/02. Kl. 135	28	III. p. P. 1 sehr lange dauernd, P. 2 ebenfalls, dazu Fieber im Wochenbett	20 25 19 10,5	"	—	15 ¹ / ₂	—	M. 3350	—
284. 00/01. Kl. 456	24	P. 1 } spontan P. 2 }	23,5 26 16 10,5	"	—	6 ³ / ₄	o. B.	M. 2600, lebt	—
285. 00/01. Kl. 426	24	II. p.	26 29 18,5 10,5	"	—	3 ¹ / ₂	—	K. 3400 lebt	—
286. 00/01. Kl. 561	40	XI. p. Alle Kinder kamen lebend zur Welt	23,5 25,5 16 10,5	II. Schl.	—	8 ¹ / ₂	—	M. 2870, lebt	—

Lfd. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
287. 00/01. Kl. 222	29	II. p. P. 1 Symphyse- otomie	24,5 26 *V. 8	I. Schl.	—	17 $\frac{1}{4}$	—	o. B.	K. 2300, Druckmarke auf dem linken Scheitel- beine, lebt	Walchersche Hänge- lage.
288. 01/02. Kl. 596	32	II. p. P. 1 normal	21 26 18 10-10,5	"	—	9 $\frac{1}{4}$	—	"	M. 3350, L. 50, K. U. 35	—
289. 01/02. Kl. 647	23	II. p. P. 1 normal, † nach $\frac{3}{4}$ Jahren an Krämpfen	22 26 10,5	"	vorz.	12 $\frac{3}{4}$	—	"	K. 3500, L. 53, lebensfrisch	—

Operativ beendigte Geburten.

1. Typische Zange.

290. 00/01. P. 553	23	IV. p. 2 $\times$ spontan, 1 $\times$ abortiert	23 26 17 10	I. Schl.	—	—	Schwanken der Herzöne Febris 41°	febril	K. 3800, starke Druck- marken; † nach 2 Stunden	Walchersche Hänge- lage.
291. 00/01. P. 402	34	VI. p.	d. 10	"	—	—	Vorfall eines Armes, drohende Asphyxie	o. B.	Kopf sehr stark kon- figuriert, 12-14	Impression nach Hofmeier.

292. 01/02. P. 143	IX. p. Sämtliche Geburten spontan, aber lange dauernd; bei der letzten Impression nach Hofmeier	21 d. 10,5	Schl.	—	der Herztöne, zunehmendes ödem. Mutter- mundes, feste Nabelschnur- umschlingung	—	—	—	O. D. leicht asph., Druck- marken von den Zangen- löffeln; lebt	nicht den erwünschten Er- folg. Wendung ist wegen der Größe des Kindes und d. geringen Fruchtwassers zu schwierig. Daher nach Inzision des Muttermundes hohe Zange, während zu- gleich von oben auf das Kind gedrückt wird.
293. 01/02. P. 350	VIII. p. 2 × Zange	22 17,5 10	I. Schl.	—	Wehen- schwäche, Mekonium- abgang, plötzlich keine Herztöne mehr wahrnehmbar	—	—	—	† Kopf gut konfiguriert	Als letzter Versuch das stark geschädigte Kind zu retten, wird hohe Zange angelegt. Sie gelingt ohne Schwie- rigkeit; Kind jedoch schon abgestorben.

3. Extraktion.

294. 01/02. Kl. 35	II. p.	d. 10,5	I. Stl.	—	22 1/2	Schwanken der Herztöne	atebrill, aber riechende Lochien Tag 4—6	† K. ohne Hirn, 4600	Herabholen des vor- deren Fusses, Arm- lösung schwierig; Kind mittlerweile ab- gestorb., Perforation.
295. 00/01. P. 257	III. p.	d. 10	Reine Fusslage	—	—	—	o. B.	Kind †	Der Kopf ist auf keine Weise ins Becken zu bringen. Kind stirbt ab. Perforation.
296. 02/03. P. 597	VIII. p. P. 1 Zange, P. 2 spontan, P. 3 Schiefelage, Wendung, P. 4 und 5 spontan, P. 6 Querlage, Wendung, P. 7 desgl.	24,5 26 14 *V. 8,5	I. dorso- postero- vorkom- mene Fusslage	—	—	Vorfall der Nabelschn., Schwanken der Herztöne	—	Kind †	Es gelingt nicht, den Kopf ins Becken zu bringen. Kind stirbt ab, Perforation, Dammriss.

Life. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
4. Wendung und Extraktion.										
297. 02/03. Kl. 170	28	III. p. P. 1 spontan, Kind †, P. 2 spontan	23 26,5 17 10 *V. 8-8,25	I. Schl.	—	47	Hinter- scheidenbein- einstellung	—	† K. ohne Hirn u. Blut 3500, L. 53. Tiefe Impression in der linken Schläfe	Es gelingt, den Kopf ins Becken zu drücken; Kind stirbt ab. Per- foration. Scheiden- dammriss II°.
298. 02/03. Kl. 123	27	II. p. P. 1 Querlage, Kind stirbt ab	26 29 19 9,75 *V. 7,75 (Zirkel)	II. Schl.	—	15½	Hinter- scheidenbein- einstellung	o. B.	† K. 4020, L. 55, K.U. 38. Frakturierung der rechten Klavikula und des linken Humerus- schaftes, nur leicht asph. † nach 5 Tagen. Grosser Blut- erguss an Schädelbasis, ferner in Bauch- höhle aus Leber u. Nebennieren	Das Eindringen des nachfolgenden Kopfes gelingt nur mit sehr grossem Kraftauf- wande. Nach Aus- stossung der Placenta leichte atomische Blutung.
299. 02/03. Kl. 136	22	IV. p. P. 1 Dauer 4 Tage, spontan, Kind †, Kind 2 und 3 leben, spontan, ebenfalls mehrfaches Kreissen	24 27 18 10,5	"	—	4¼ Tag	Hinter- scheidenbein- einstellung	"	M. 3800, L. 54, leicht asph., lebt	Hystereuryse.
300. 02/03. Kl. 181	27	II. p.	24,5-25 16,75-19,75	I. Schl.		25	Hinter- scheidenbein- einstellung	"	K. 2720, L. 50,4	Hystereuryse. Wiederholte Ver- suche, die Placenta

							lebt	gnit.
302. 01/02. Kl. 84	27	VII. p. 4 < Perfor. 2 < künstliche Frühgeburt, beide Kinder tot, das eine bald p. p., das andere nach 1 1/4 Jahre.	24 28 18 *V. 8	I. Schl.	—	—	† K. bds. Klavikular- fraktur. Kramphafte Inspiration, und krampf- artige Arm- bewegungen, † nach 5 Std.	—
303. 00/01. P. 429	22	III. p. P. 1 Zange, † nach 10 Min., P. 2 Querlage, Wendung, Kind lebt	d. 10	"	—	Temp. 38,2°. Kopf nach 80 Std. guter Wehentätig- keit nicht eingetreten	afefril tiefe Im- pression an der linken Schläfe; Fazialisparese rechts, lebt	Eindrücken d. Kopfes in den Beckeneingang.
304. 01/02. P. 342	27	II. p.	21 27 18 10	"	—	Hochstand des Kontrak- tionsringes, Mekonium- abgang	Pneu- monie	Wendung nach Inzision des Mutter- mundes. Kleidotomie rechts, Perforation d. abgestorbenen Kindes. Totaler Dammriss.
305. 02/03. P. 142	42	X. p. P. 1 spontane, lange Dauer, Kind †, P. 2—4 Frühgeburt, im 7. Mon. †, P. 5 u. 6 Perforat., P. 7 Querlage, lebt P. 8 u. 9 Früh- geburten †	d. 10	"	—	Hinter- scheitelbein- einstellung	† Kind ohne Him 3500, L. 57. Starke Druck- marken	Bei dem Einpressen des Kopfes ins Becken stirbt das Kind ab.

Lit. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
306. 00/01. P. 378	—	II. P. 1 Zange, Kind †; angeblich durch Eindrücken der Kopfknöchen	d. 10	I. Schl.	—	—	Vorfall der Nabelschnur	—	M. mässig asph., lebt	—
307. ? ? Pol.	33	IV. p. P. 1 und 2 normal; P. 3 Kunsthilfe	26 29 10,5	Schl.	—	—	Vorfall der Nabelschnur; Schwanken der Herzöne	o. B.	K. 4000, mässig asph., lebt	—
308. 01/02 Kl. 615	36	II. p. P. 1 lange Dauer- Zange, † nach 1 Tagem	24 26 18 9-9,5 *V. 8-8,5	I. dorso- post. Querlage	—	3 3/4	—	—	M. 2870, schreit nach Entfernen d. Schleimes, lebt	Hystereuryse. Wigand-Martin- Winckelscher Hand- griff. Dammriss.
309. 02/03 Kl. 679	27	IV. p. P. 1 normal, P. 2 Zange, P. 3 Perforation	23 26 18,5 10,5 *V. 8,5	I. dorso- post. Querlage	—	3 1/2	—	—	M. 2640, lebt	Hystereuryse. Portio-Scheiden- Dammriss.
310. 00/01. Kl. 349	28	II. p.	26 28,5 16 10	Kind 1: Schädelh. Kind 2: dorso- anteriore Querlage	—	—	Gemini	—	Kind 1: 2380, " 2: 2270. Kind 2 leicht asph.	1. Zwilling: spontan. 2. Zwilling: Wendung und Extraktion.

5. Laparotomie im Gefolge der Geburt.

Lit. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
311. 00/01. Kl. 199	30	VI. p. P. 1 sehr lange, spontan, P. 2 desgl. P. 3 u. 4 Querlage P. 5 spontan.	d. 10 *V. 8,5	Querlage in abdomine	—	—	Spontane Uterus- ruptur. Kind und Placenta in der	Mutter nach 2 3/4 Wochen geheilt entlassen	† K. 3650. L. 55	Kind wird gewendet und extrahiert. Pla- centa herausgezogen. Laparotomie. Naht des Uterusrisses.

312.01/02. Kl. 51	27	V. p. P. 1 spontan, P. 2 desgl., P. 3 Zange, Kind lebt. P. 4 Wendung, Kind + nach 3 Wochen. Urinistel	25 18 27 10	II. Schl.	knstl.	6 1/2	—	—	M. 2840, leicht asph., lebt	38. Woche. Hystereuryse.
313.01/02. Kl. 442	20	II. p. P. 1 spontan, 1 1/2 Tage, + nach 9 Wochen an Krämpfen	21 18 24 9,5	I. Schl.	"	5	—	—	M. 2430, nicht asph., lebt	36. Woche. Hystereuryse.
314.02/03. Kl. 3	23	III. p. P. 1 Perforation, P. 2 Abort	d. 10	"	"	5 1/2	—	—	M. 1950, lebt	Hystereuryse.
315.02/03. Kl. 34	29	IV. p. P. 1 Zange, Kind + nach 1/2 Jahre, P. 2 Perforation, P. 3 künstliche Frühgeburt +	24 17,5 28 10,5	II. Schl.	—	10 1/2	—	—	M. 1865, lebensfrisch	Hystereuryse.
316.01/02. Kl. 356	24	III. p. P. 1 spontan P. 2 Wendung	22 16,5 24 10,5	I. Steiss- lage	knstl.	—	—	—	M. 2080, nicht asph., lebt	Hystereuryse. Grösse der Frau 1,46 m.
317.02/03. 4 Kl. 432	23	II. p. P. 1 Dauer 3 Tage, Perforation	22 18 26 10 *V. 8,25 bis 8,5	I. Schl.	—	—	—	afebril	M. 2600, lebt	Hystereuryse. Grösse der Frau 1,43 m. 34. Woche. Walchersche Hänge- lage.

Lfd. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
318. 02/03. Kl. 144	31	II. p. P. 1 Dauer 4 Tage, Perforation des abgestorbenen Kindes	24 26 17,5 9,75	II. Schl.	—	17 ³ / ₄	—	afebril, riechende Lochien, Cystitis Tag 5—9	† M. 2550, K. U. 34. Stirbt nach wenigen Minut., grosser sub- arachnoidealer Bluterguss	Hystereuryse, Wen- dung und Extraktion. Dammriss.
319. 00/01. Kl. 543	33	III. p. P. 1 spontan, 12 Std., Kind † bald nach der Geburt, P. 2 Perforation, Urinfistel	25 27,5 16 9,5 *V. 8,5	II. Quer- lage	—	—	—	o. B.	† M. 2270, Fraktur der rechten Klavikula, Infraction d. linken Tibia	Hystereuryse. 36. Woche. Atonische Nach- blutung.
320. 02/03. Kl. 124	28	III. p.	26 29 19 9,75 *V. 7,5 (Zirkel)	II. dorso- poste- riore Querlage	knstl.	23 ¹ / ₄	—	—	† K. 2390. stirbt nach 1 Stunde. Fraktur des rechten Schenkelbeines Subduraler Bluterguss	36. Woche. Wendung und Ex- traktion. Expressio placentae.
321. 02/03. Kl. 149	31	V. p. P. 1 Zange, Kind †, P. 2 - 4 Perforation	23,5 25,5 16,75 9,75—10	II. dorso- poste- riore Querlage	—	4 ¹ / ₂	—	—	K. 2890, lebt	Grösse der Frau 156,5 cm. Hystereuryse. Wen- dung und Extraktion. Expressio placentae. 35. Woche.
322. 00/01. Kl. 543	33	III. p. P. 1 spontan, 12 Std., Kind † bald nach Geburt, P. 2 Perforation,	25 27,5 16 9,5 *V. 8,5	II. Stl. Steiss ab- gewichen	—	—	—	Tag 8: leichte Einklind- lichkeit der	† M. 2270, Schädel- und Klavikular- Fraktur	Hystereuryse, Extrak- tion am vorgefallenen Fusse.

7. Perforation

a) des lebenden Kindes.

324. 00/01. Kl. 540	24	IL. p. P. 1 sehr lange, spontan, † nach einigen Minuten	25 26.5 10	I. Schl.	—	—	Kontraktions- ring am Nabel, T. 88 ^o , Kopf trotz sehr lang- wehentätige- keit beweglich über d. Becken. Mekoniumabg- Schwanken der Herztöne, Muttermund kleinhand- tellergröss	—	K. 3400	Wegen der gefährdrohen- den Ausziehung d. unteren Uterinsegmentes ist Ent- bindung dringend indi- ziert. Wendung und hohe Zange würden die Mutter in die höchste Lebens- gefahr bringen. Daher Opferung des Kindes.
325. 00/01. Kl. 375	28	IV. p. P. 1 spontan, P. 2 Totgeburt, P. 3 Kunsthilfe	*V. 8.5	II. Schl.	knstl.	10 1/2	Hochgradige Ausziehung des unteren Uterin- segmentes	afebril	M. 3150	Da die Wendung zu gefährlich ist, Per- foration des schwer geschädigten Kindes.
326. 02/03. P. 527	36	IL. p. P. 1 spontan, aber sehr lange	d. 10.5	—	vorz.	—	Hochstand des Kontraktions- ringes, starke Cervixdehnung Wehen- schwäche, drohende Asphyxie	afebril	Kind über- tragen, ohne Blut u. Hirn 3200, L. 58	Walchersche Hängelage, Impression nach Hofmeier und hohe Zange versagen. Da der Kontraktionsring mit jeder Wehe höher steigt, ist die Perforation des lebenden Kindes nicht zu umgehen. Kranioklasie. Kleiner Scheidenriss.

b) des toten Kindes.

* 327. 02/03. Kl. 309	36	IL. p. P. 1 Abort	26 28 10.5 10-10.5	I. Schl.	vorz.	41	Febris intra partum; 38.3 ^o , Zersetzung des Frucht- wassers, Mekonium- abgang	16 Tage febril, 4mal Schüttel- frost; 40.2 ^o . Bei Entg. links wall- nussgröss. empfindl. Adnexitum.	M. ohne Hirn 2750	Hystereuryse. Kind stirbt ab, Perforation und Kranioklasie, Scheidenriss.
--------------------------	----	----------------------	-----------------------	----------	-------	----	---	---	----------------------	--

Life. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
328. 02/03. P. 729	38	XI. p. 2 $\times$ Kunsthilfe	d. 10 10,5	II. Schl.	vorz.	—	Hinter- scheidenbein- einstellung	—	Kind 2700	Wendung misslingt, Kind stirbt dabei ab. Perforation und Kranioklasie.
329. 02/03. Kl. 161	27	III. p. P. 1 Kind $\ddagger$, P. 2 Steisslage $\ddagger$.	23 25 17,75 9,75	"	—	16 $\frac{3}{4}$	Hinter- scheidenbein- einstellung	o. B.	K. 2500 ohne Hirn	Wendung misslingt. Kind stirbt ab. Per- foration und Kranio- klasie.
330. 00/01. P. 587	29	V. p. 2 $\times$ künstl. Früh- geburt, P. 1 spontan, P. 2 hohe Zange, P. 4 Impression des Kopfes	d. 10—9,5	I. Schl.	—	—	Placenta praevia	—	—	Der Hystereunter hatte, wie sich später heraus- stellte, die Nabelschnur komprimiert. Infolge da- von starb das Kind ab. Perforation und Kranio- klasie.

8. Kaiserschnitt.

331. 00/01. Kl. 449	30	II. p. P. 1 Frühgeburt im 8. Monat, lebt.	23 25 16,5 10	Schl.	—	—	—	Mutter nach 8 Tag, gesund mit Kind ent- lassen	K. 2500, lebt	Konservativer Kaiser- schnitt. Grösse der Frau 1,27 m.
332. 02/03. 18. V. 02	28	II. p. P. 1 künstliche Frühgeburt, Perforation des lebenden Kindes in- folge Komplikation mit schwerer	21,5 26,5 16,5 10,5 *V 8,5 8,25 (Zirkel)	I. Schl.	—	—	—	Tag 2: 38 $\frac{1}{2}$, sonst o. B.	K. 2220, leicht asph., lebt	Konservativer Kaiser- schnitt 3—4 Stunden nach Wehenbeginn; Blase war schon vor kurzer Zeit ge- sprungen.

KL. 503	17 10 *V. 8,25	Hebamm untersucht. Blase kurze Zeit vor der Operation gesprungen	† am 3 Tage des Opera- tionstages 98% Tag 2: 380, Tag 3: 38,60, Tag 4: 400, † an Herz- schwäche	asph., Sektion der Mutter: Peritonitis purulenta.
	1 > Perforation, 5 > Frühgeburt, Kind 3 spontan, † nach 12 Std. Alle Kinder sind tot.			

9. Entbindung per laparotomiam.

334. 01/02 KL 12	39	XI. p. Alle Geburten schwer, 1 < Querlage, 1 < Zange. 8 Kinder leben	24 10.5	27	I. Schl.	—	—	Spontane Uterus- ruptur. Kind stirbt be- reits am und Placenta folgenden Tage in der Bauchhöhle	† Mutter K. U. 39, leichenstarr	† K. 4400, L. 52, K. U. 39, leichenstarr	Hofmeiers Impression misslingt, ebenso der doppelte Handgriff der Siegenmündin. Spon- tane Uterusruptur.
---------------------	----	---	------------	----	----------	---	---	--	--	---	--

Vera 7,5–6,5.

I. Erstgebärende.

Spontangeburt.

335. 00/01. 19 Kl. 236	I. p.	27 17	28,5 9,5	I. Schl.	—	30 $\frac{1}{2}$	—	—	M. 3500, leicht asph., lebt	—
336. 00/01. 25 Kl. 230	I. p.	23 15	25 9	II. Schl.	knstl.	7	—	Tag 9: 38 $^{\circ}$	M. 3100	—

Operativ beendigte Geburten.

1. Perforation des lebenden Kindes.

337. 02/03. Kl. 254	I. p.	23 16.75 *V. 7,5	Schl.	—	44 ^{3/4}	Kontrak- tionsring steigt all- mählich fast bis z. Nabel. Mekonium- abgang	o. B.	M. 2280 ohne Hirn. Druck- marken an beiden Scheitel- beinen, †	Da die Wehen zu schwach sind, den Muttermund zu erweitern, wird zunächst Hystereurynter eingelegt. Walchersche Hängelage ohne Erfolg. Da Kon- traktionsring mit jeder Wehe beängstigend höher steigt, Perforation des lebenden Kindes.
------------------------	-------	------------------------	-------	---	-------------------	--	-------	--	---

Lfd. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
---------------------------------	-------	----------	------------------	-----------------	-------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------	------	-------------

2. Wendung und Extraktion.

338. 01/02. P. 106	24	I. p.	26 27 17,5 9,5	I. Schl.	—	—	Hinter- scheitelbein- einstellung, Vorfall der Nabelschnur	—	Kind †	Bei der Wendung stirbt das Kind ab und wird perforiert.
339. 01/02. P. 461	24	I. p.	24 26 17 9,5	"	vorz.	—	—	Stark riechende Lochien, mehrmals 38°	Kind †. Sehr harter Schädel, Gewicht 4000 g. Tiefe Impression links	Da die Geburt mit vorangeheendem Schädel aussichtslos erscheint, Wendung. Inzisionen in den Muttermund. Kind stirbt ab, wird perforiert.

3. Kaiserschnitt.

340. 02/03. Kl. 441	19	I. p.	24 27 17 8,8 *V. 7,5	—	—	—	—	Schmerzen in den Brüsten, Schründen, 3× leichtes Fieber	Kind schwer asph., lebt	Konservativ.
341. 01/02. Kl. 44	42	I. p.	24 27 15 *V. 7,25	I. Schl.	—	—	Ausserhalb der Klinik mehrfach untersucht; doch steht d. Blase noch. Ödeme der Beine, Anasarka der	afebril; Exitus der Mutter an Nephritis. Sektion: vollkomm. einwandfreie Wundverhältnisse, Nephritis paralytisch	Kind mit Meconium stark besudelt, bald gute Atmung	Porro. Grösse der Mutter 1,20 m.

Keine Spontangeburt.

1. Wendung.

342. 02/03. P. 128	31	V. p. 4 × wurden spontan kleine Kinder geboren	25 18	28 9—9,5	Schl.	—	—	Kontrak- tionssing hoch, Hinter- scheidenbein- einstellung	—	Kind † 4000, sehr tiefe Druck- marken	Bei der Wendung müssen beide Humerusdiaphysen frakturiert werden. Kind stirbt ab, Per- foration.
343. 02/03 P. 414	25	II. p. P. 1 Kind schwer asph. †. Künst- liche Einleitung der Geburt am normal.Schwanger- schaftsende	30 16	32 9	I. Schl.	—	—	Hinter- scheidenbein- einstellung; starke Cervix- dehnung, Vorfall der Nabelschnur	—	K. tief asph., † nach einigen Stunden.Löffel- förmige Im- pression auf dem linken Scheidenbein. Sektion: Blut- erguss unter dem linken Scheidenbein und in der rechten Niere	—

2. Extraktion.

344. 02/03. Kl. 306	41	VIII. p. P. 1 Perforation, P. 2 Frühgeburt, † mens. VII, P. 3 Perforation, P. 4 Symphyseo- tomie im 7. Monat; Kind † nach 36 Std., P. 5 Kaiserschnitt, Kind † n. 18 Woch., P. 6 Kaiserschnitt, Kind † n. 32 Woch., P. 7 Steisslage, Perforation.	24 16	27,5 8,75	II. dorso- post. Fusslage	—	10	Vorfall der Nabelschnur	Tag 4 und 5: 38,4°; sonst o. B.	M. 3850, am linken Scheidenbein tiefe Impression	Der Kopf folgt nicht ins Becken, Kind stirbt ab, wird perforiert.
------------------------	----	---	----------	--------------	---------------------------------	---	----	----------------------------	---	--	---

Lfd. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
3. Künstliche Frühgeburten.										
345. 02/03. Kl. 198	26	II. p. P. 1 künstliche Frühgeburt, lebendes Kind	23 24 17,5 9	II. Steiss- lage	—	11	—	o. B.	K. 2580, etwas asph., lebt	Hystereuryse, Wigand-Martin- Winckelscher Hand- griff, Dammriss, mässige atonische Blutung.
346. 02/03. Kl. 376	31	III. p. P. 1 Kaiserschnitt, Kind lebt. P. 2 Symphyse- otomie	24 27 17 8,5 *V. 7,25 bis 7,5	II. dorso- poster. Querlage	—	22 ¹ / ₂	—	o. B.	K. 1610, asph., i nach wenigen Std. Ausgedehnter Bluteruss über der Kon- vexität des Hirns, im subarachnoi- dealen Raum der hinteren Schädelgrube u. d. Medulla oblongata. Lungen wenig lufthaltig	33.—35. Woche. Auf den Vorschlag, am Ende der Schwanger- schaft den Kaiser- schnitt machen zu lassen, geht Gravida nicht ein. — Hyste- reuryse, Wendung und Extraktion, Ein- drücken des Kopfes ins Becken gelingt nur mit sehr grosser An- strengung. Portierriss.

4. Kaiserschnitt.

347. 01/02. Kl. 623	32	II. p. P. 1 Kaiserschnitt, Kind lebt	22,5 24,5 14 8,5 *V. 6,5 bis 6,75	I. Schl.	—	—	—	afebril	M. 4070, L. 54, mit Meconium bedeckt, bald gute Atmung	Konservativ. Die Frau hatte noch keine Wehen verspürt.
348. 00/01. Kl. 303	24	II. p.	23,5 26 18 10 *V. 7,5	Schl.	—	—	—	Tag 1: 38,2—39,4 Tag 2: 38,40 dann	M. 3280, mässig asph., lebt	Konservativ. Stehende Blase, starke Wehen.

mit gesprungener
Blase in die Klinik.

lebt

monia
gela-
tiosa

41. 39.

I. 1. Anore.
Trauma (angeblich)
P. 2 Perforation,
P. 3 Kaiserschnitt

Kl. 221

Enge Becken ohne Angabe der C. v. oder C. d.

I. Erstgebärende.

Spontangebürten.

350. 02/03. P. 538	21	I. p.	Mässig eng	—	—	—	o. B.	lebt	—
351. 02/03. P. 244	28	I. Lernte mit 3 Jahren laufen	Enges Becken	I. Schl.	vorz.	31 1/2	Zu schwache und zu kurze Wehen; der vordere Halb- ring d. Mutter- mundes zwisch. Symphyse und Kopf einge- klemmt, stark ödematös, dunkelblau	lebt	Reposition des ein- geklemmten Mutter- mundes.
352. 01/02. P. 468	26	I. p.	Platt und allgemein verengt	"	—	—	—	Kind 2500, auf dem linken Scheitelbein tiefe Druckmarke vom Pro- montorium	Walchersche Hänge- lage.
353. 02/03. P. 677	23	I. p.	20 24 17	II. Schl.	—	—	—	Kind 3250	—

Lfd. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
354. 01/02. P. 693	26	I. p.	Enges Becken	I. Schl.	vorz.	—	Intra partum 38,1 ^o	—	K. 2500, † intra partum. Fraktur des rechtl. Schenkel- beines, Bloss- liegen d. Dura Sektion: Sehr starke Blutung in der hinteren Schädelgrube infolge Zer- reissung des Sinus sig- moidens	Wegen Blutung Expressio placentae.
355. 01/02. P. 406	20	I. p.	Mässig allgemein verengt	—	vorz.	34 1/2	Hochstand des Kontraktions- ringes	—	M. 2500, lebt	—
356. 00/01 P. 621	37	I. p.	Pelvis angusta	II. Schl.	vorz.	—	Vorfall der Nabelschnur	—	M. 3000, † gleich nach der Geburt	Impression nach Hofmeier. Totaler Dammriss.
357. 00/01. P. 424	34	I. p.	24 26,5 17	"	vorz.	—	Sekundäre Wehen- schwäche, Febris intra partum	—	Kind 3000	Ödem des Mutter- mundes. Walchersche Hängelage. Dammriss.
358. 02/03. KL. 283	26	I. p.	19 22,5 15	I. Schl.	—	23/4	—	o. B.	K. 2670	Dammriss.
359. 00/01. KL. 314	22	I. p.	25 28 17	"	vorz.	77 3/4	Schwanken der Herzton- Meconium- abgang. Febris 38 ^o	Tag 4-7: Temper. gegen 38 ^o	K. 3010, †, L. 52	Walchersche Hänge- lage, Episiotomie. Wegen Blutung Expressio placentae.
360. 00/01. 24	24	I. p.	26 25,5	II. Schl.	—	63/4	—	—	M. 2850	Dammriss II ^o

1. Extraktion.

361. 02/03. KL. 101	I. p.	22 24 17,5	reine Steiss- lage	—	—	Schwanken der Herztöne, Meconium- abgang	—	Kind übertragen †	Extraktion äusserst schwierig. Kopf sehr hart. Leichter Riss in Clitoris und Scheide. Kind stirbt bei Entwicklung des Kopfes ab.
------------------------	-------	---------------	--------------------------	---	---	---	---	-------------------------	---

2. Zange.

362. 02/03. P. 543	I. p.	mässig verengt, platt	I. Schl. Vorder- scheitel- beinein- stellung	—	—	Hochstand des Kontraktions- ringes, Wehen- schwäche, Temp. 38°	—	M. 2400, lebensfrisch	Scheiden-Dammriss.
363. 00/01. P. 523	I. p.	mässig eng	I. Schl.	—	—	Stillstand der Geburt, Schwanken der Herztöne	—	K., K. U. 38.5. deutl. Druck- marken bds., lebt	—
364. 02/03. P. 547	I. p.	—	II. Schl.	vorz.	—	Drohende Asphyxie. Die Nabelschnur wurde durch linke Schulter gedrückt	mehr- mals 38,8°	Kind 3500, K. U. 36, bleich asph., †	Scheidenriss.

3. Perforation.

365. 02/03. P. 227	I. p. Mit 4 Jahren laufen	enges Becken, platt	I. Schl.	—	—	Dauerkontrak- tion des Uterus, starke Druck- empfindlich- keit d. unteren Uterin- segmentes. Sinken der Herztöne, Muttermund noch nicht ganz ver- strichen.	o. B.	M., ohne Hirn 2500	Walchersche Hänge- lage erfolglos. Per- foration des abgestor- benen Kindes. Nach einer Zeit wegen auf- tretender Eklampsie Kranioklasie.
-----------------------	---------------------------------	---------------------------	----------	---	---	---	-------	--------------------------	---

Lfd. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
II. Mehrggebärende. Spontangeburt.										
366. 02/03. P. 522	34	VIII. p. 3 $\times$ spontan ge- boren, darunter eine Totgeburt, 3 Kinder $\dagger$ in den ersten Lebens- monaten	Leicht verengt	I. Schl.	vorz.	—	Nabel- schnur- vorfall	—	Nicht asph., lebt	Walchersche Hängelage.
367. 02/03. P. 588	37	VII. p. P. 1 Zange, leben- des Kind, P. 2 Abort, P. 3 spontan, Kind lebt, P. 4—6 Abort	24 29 19	II. Schl.	„	—	—	—	K. 4250, L. 56, K. U. 39, lebt	Walchersche Hängelage.
368. 00/01. P. 590	39	XVII. p. 2 $\times$ Abort, 1 $\times$ Plac. praev., 1 $\times$ macerirte Frucht, die übrigen Ent- bindungen spontan, 3 Tage dauernd	25 29 19	II. Schl. Vorder- scheitel- bein- stellung	—	—	Mekonium- abgang	—	K., leicht asph., Druckmarke auf rechtem Scheitelbein, lebt	Walchersche Hängelage.
369. 02/03. P. 387	40	VI. p. 2 $\times$ spontan, 2 $\times$ Zange, 1 $\times$ Abort	Platt	I. Schl.	—	—	Krampf- wehen, Uterus fast ständig	—	K., schwer asph., lebt	Impression nach Hofmeier.

							lebt	
371. 02/03. P. 338	25	schwer, P. 1 und 4 Per- forationen	Allgemein mässig eng	"	—	—	Kind 2500, lebt	Walchersche Hängelage.
372. 02/03. P. 345	27	II. p. P. 1 spontan	Mässig eng	—	—	Vorfall der Nabelschnur	Kind 2500, bleich asph., † nach 1/4 Std.	Walchersche Hängelage.
		III. p. P. 1 und 2 normal, aber sehr lange dauernd, Kind 2 stirbt während der Geburt ab		—	—			
373. 02/03. P. 213	28	IV. p.	Enges Becken	I. Schl.	—	Vorfall der Nabelschnur	† Kind 3000, stirbt während der Geburt ab	—
374. 01/02. P. 188	35	IX. p. 6 > spontan, 3 Aborte	23 26 18	"	vorz.	—	M. 3800, lebt	Wegen Blutung manuelle Placentar- lösung.
375. 01/02. P. 285	25	V. p. 1 > Frühgeburt, 1 > Querlage, beide Kinder †, 2 > Abort	Ext. 16	"	—	—	Kind 2500, lebt	Impression nach Hofmeier
376. 02/03. P. 691	—	Multipara, Geburten dauerten immer lange	Pelvis angusta geringen Grades, platt	"	—	—	Kind 4000, leicht asph., lebt	Atonia uteri.
377. 01/02. P. 715	30	II. p. P. 1 Dauer 22 Std.	Mässig platt	II. Schl.	5 1/2	Vorliegen d. Nabelschnur	M. 2500, leicht asph., lebt	Reposition der Nabel- schnur.

Lfd. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
378. 00/01. P. 426	30	IV. p. P. 1—3 leicht und schnell	25 28 20	I. Schl.	vorz.	16 1/4	—	—	K. 4000, Kopf stark ausgezogen, bds. Druck- marken, lebt	Ödem des Mutter- mundes.
379. 00/01. P. 567	22	II. p. P. 1 Zange, Kind + nach einigen Tagen an Krämpfen	Mässig eng	II. Schl.	—	—	—	—	lebt	Walchersche Hänge- lage, Dammriss.
380. 00/01. P. 369	32	II. p. P. 1 Dauer 3 Tage, spontan, grosses Kind	"	"	—	—	—	—	K. 4000, K. U. 40, lebt	Impression nach Hofmeier.

Operativ beendigte Geburten.

1. Zange.

381. 00/01. P. 432	33	II. p. 1 ♂ Zwillinge, starben bald nach der Geburt	"	I. Schl.	—	—	—	1 mal 38°, sonst o. B.	K. 3750, lebensfrisch	Cervix- u. Dammriss.
382. 02/03. P. 395	30	III. p. P. 1 manuelle Plazentalösung; dann Ventrofixation des Uterus,	"	Schl.	—	—	Krampf- wehen, Schwanken der Herztöne	—	M. 3760, asph., lebt	Dammriss.

384. 01/02. P. 416	45	X. p. 2 < Abort, mehrmals Zange	22 28	"	—	—	Erschöpfung der Kreisenden, Schwanken der Herztöne	erhebliche Druck- marken, lebt	ist sehr schwer, vordere Muttermunds- lippe gequetscht, blutet stark, kleiner Cervixriss.
385. 00/01. P. 598	30	II. p. P. 1 Nabelschnur- vorfall, Perforation des abgestorbenen Kindes	24 30 19	II. Schl.	—	—	Stillstand d. Geburt wegen Wehen- schwäche	Druck- marken, lebt	—

2. Extraktion.

386. 02/03. P. 200	34	IV. p. P. 1 spontan, P. 2 spontan, Kind stirbt an Lebens- schwäche, P. 3 spontan, Kind stirbt nach 7 Woch.	Mässig allgemein verengt	II. voll- kommene Fusslage	knstl.	—	Nabel- schnur- vorfall	Kind 2500, leicht asph., lebt	Wigand- Martin-Winckelscher Handgriff.
-----------------------	----	--	--------------------------------	----------------------------------	--------	---	------------------------------	-------------------------------------	--

3. Wendung und Extraktion.

387. 02/03. P. 552	—	V. p. Frühere Geburten normal	Mässig verengt, platt	II. dorso- anteriore Querlage	knstl.	—	—	Kind lebt	Wigand- Martin-Winckelscher Handgriff, leichter Scheidenriss.
388. 02/03. P. 472	27	IV. p.	Mässig verengt	Querlage	—	—	—	K. 3500, leicht asph., lebt	Wigand- Martin-Winckelscher Handgriff.

Lfd. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
389. 02 03. P. 210	29	IX. p. P. 1 Querlage, lebte P. 2 manuelle Placentarlösung, P. 3 Placenta praevia. P. 4 Fusslage, P. 5—6 normal, P. 7 Fusslage, P. 8 spontan, manuelle Lösung	Mässig plattes Becken	II. dorso- anteriore Querlage	knstl.	—	—	—	M. 4000, lebensfrisch	Wigand- Martin-Winkelscher Handgriff.
390. 01 02. P. 320	30	V. p. P. 1 spontan. schwerer Damm- riss, Kind lebt, P. 2 spontan, P. 3 Querlage, Kind lebt, P. 4 Schädellage, Nabelschnur- vorfall, Kind † ab.	28 30 18	"	—	—	—	—	Kind 2830, tiefe löffel- förmige Im- pression auf dem rechten Schambein. lebt	Impression des Kopfes ins Becken, totaler Dammriss.
391. 00 01. P. 40	30	VI. p. Frühere Geburten normal	—	I. Quer- lage	—	—	—	afebril	Kind † nach 6 Std. 14 Tage übertragen	—
392. 01 02. P. 113	29	VII. p	Mässig verengt	Zwilling, 1. in Schäd- ellage,	—	—	Nabelschnur- vorfall, Schwanken der Nabelschnur, Kindes-	—	K. U. 34, lebensfrisch	Kind 1 spontan. Kind 2 in Querlage. Wendung, Diaphysen-

No. 30., P. 2 u. 3 spontan, lebende Kinder, P. 4 Frühgeburt, †	Mässiges Becken	II. Schl.	—	—	Schmerzhaftigkeit d. unteren Uterin-segmentes, Schwanken der Herztöne	Die ersten Tage Temperaturen bis 38°	Kind †	Walcherse Hängelage ohne Erfolg.	Dauer Wendung und Extraktion, Veit-Smellie.
394. 00/01. P. 524	II. p. P. 1 Zange, Kind lebt	—	—	—	Schwanken der Herztöne	—	Kind †	—	—
395. 00/01. P. 725	III. p. P. 1 spontan, lange dauernd, P. 2 Wendung	II. dorso- anteriore Querlage, dann Hinter- scheitel- beinein- stellung	knstl.	—	Schwanken der Herztöne	—	K., leicht asph., lebt	Äussere Wendung bei stehender Blase auf den Kopf. Blasen-sprengung. Impression misslingt. Da Herztöne schwanken, Wendung. Expressio placentae wegen Blutung.	—
396. 02/03. P. 494	III p. P. 1 spontan, P. 2 Zange, beide Kinder in Vorderhauptslage, leben	II. Schl.	—	—	Hinter-scheitelbeineinstellung, Mekonium-abgang, Schwanken der Herztöne	—	M. 3500, †. Klavikulärfraktur links, löffelförmige Impression auf dem linken Scheitelbein	Hystereuryse. Ein-drücken des Kopfes, Scheiden-Dammriss.	—
397. 02/03. P. 509	VI. p. P. 1 Steisslage, P. 2 Perforation, P. 3-5 normal	I. Schl.	—	31	Hinter-scheitelbeineinstellung, Vorfall der Nabelschn., Sinken der Herztöne	—	Kind schwer asph., † nach 3 Std. Sektion: Blutung über die ganze Konvexität und Basis d. Hirns. Keine Knochenverletzung	Das Eindringen des Kopfes ist sehr schwierig.	—

Lfd. No. Jahrgang Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Bemerkungen
398. 02/03. P. 694	30	II. p. P. 1 Wendung und Extraktion, Kind lebt	Becken mässig verengt	I. Schl.	kunstl.	—	Hinter- scheitelbein- einstellung, Kopf sehr hart und gross, stürmische Wehen	o. B.	† Kind ohne Hirn und Blut 4000, L. 54, K. U. 41	Bei der Extraktion stirbt das Kind ab. Perforation. Kleiner Scheidendamriss.
399. 00/01. P. 595	24	III. p.	25 27 17,5	II. Schl.	vorz.	—	Vorfall der Nabelschnur., Schwanken der Herztöne	—	Kind nicht asph., lebt, Druck- marken	Der Kopf muss ins Becken eingedrückt werden.
400. 01/02. P. 102	38	V. p. 2 $\times$ Nabelschnur- vorfall, nur 1 Kind lebt	Becken mässig verengt	I. Schl.	—	—	Vorfall der Nabelschnur und des rechten Armes, Schwanken der Herztöne	—	M. 3800, asph., lebt	Kopf tritt nur auf starken Druck von oben ins Becken, γ
401. 01/02. P. 677	37	V. p. 4 Kinder spontan, leben, Dauer ca. 20 Std.	Becken mässig verengt und platt	"	vorz.	—	Vorfall der Nabelschnur	o. B.	K. †	Veit-Snellie, Kind stirbt ab, Dammriss II°.
402. 01/02. P. 722	25	II. p. P. 1 28 Std.	Mässig eng	II. Schl.	"	—	Vorfall der Nabelschnur u. ein. Armes	"	Kind † 4000	Kind stirbt während der Wendung ab.

4. Perforation.

403. 00/01. P. 437	31	II. p. P. 1 spontan, lange Dauer, Kind lebt	23 26 18	"	—	—	Droh. Uterus- ruptur, Aus- bildung einer Hinterscheitel- beineinstellung Schwanken der Herztöne,	afebril, aber riechende Lochien	—	Walchersche Hänge- lage und Impression nach Hofmeier erfolg- los. Perforation und Kranioelastie des ge- schädigten Kindes
-----------------------	----	--	-------------	---	---	---	--	--	---	--

	Anzahl	Mortalität der Kinder	Erkrankungen im und Störungen im Wochenbett	Mortalität der Mütter	V. 10,0—9,6	9,5—8,6	8,5—7,6	7,5—6,5	Primiparae	Multiparae	Beckenendlagen	Ungünstige Schädelagen	Querlagen
Spontan	235 = 67,31%	7 = 2,98%	25	0	51	141	41	2	112 = 47,66%	123 = 52,34%	5	4	0
Tiefe Zange	9 = 2,52%	1 = 11%	3	0	2	5	2	0	5	4	0	1	0
Hohe Zange	5 = 1,43%	1 = 20%	0	0	0	2	3	0	1	4	0	0	0
Manualhilfe bei Beckenendlage	8 = 2,29%	6 = 75%	1	0	1	3	3	1	0	8	8	0	0
Wendung und Ex- traktion	36 = 10,32%	15 = 41,67%	4	0	3	11	13	4	6	30	0	13	7
Künstliche Früh- geburt,	22 = 6,30%	8 = 36,4%	6	0	0	7	13	2	1	21	4	0	9
Handgriff der Siegel- mund	2 = 0,57%	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0
Kaiserschnitt	11 = 3,15%	1 = 9,1%	4	5	0	3	3	5	4	7	0	0	0
Perforation	18 = 5,15%	18	5	0	0	4	13	1	8	10	0	3	0
Laparotomie wegen Uterusruptur	3 = 0,86%	2	0	2	0	1	2	0	0	3	0	1	1
Summe	349	59 = 16,9%	50	7	57	177	100	15	139 = 39,83%	210 = 60,17%	17	23	17

Tabelle 2.

Diejenigen Geburten bei engem Becken, bei denen die C. v. oder C. d. nicht angegeben war.

Die Gesamtzahl der Geburten beträgt 54.

	Anzahl	Mortalität der Kinder	Störungen und Erkrankungen im Wochenbett	Mortalität der Mütter	Primiparae	Multiparae	Beckenendlagen	Ungünstige Schädelagen	Querlagen
Spontan	26 = 48,15%	5 = 19,23%	2	0	11 = 42,31%	15 = 57,69%	0	0	0
Wendung und Extraktion	16 = 29,63%	7 = 43,75%	1	0	0	16 = 100%	0	4	6
Typische Zange	8 = 14,81%	1 = 12,5%	2	0	3 = 37,5%	5 = 62,5%	0	0	0
Manuallilfe bei Becken- endlagen	2 = 3,7%	1 = 50%	0	0	1 = 50%	1 = 50%	2	0	0
Perforation	2 = 3,7%	2	0	0	1	1	0	1	0
Summe	54	16	5	0	16 = 29,63%	38 = 70,37%	2	5	6

Die Gesamtzahl der Geburten beträgt 305.

	Anzahl	Mortalität der Kinder	Störungen und Erkrankungen im Wochenbett	Mortalität der Mütter	10,0—9,6	9,5—8,6	8,5—7,6	7,5—6,5	Primiparae	Multiparae	Beckenendlagen	Ungünstige Schädellagen	Querlagen
Spontan	223 = 73,2%	6 = 2,24%	25	0	51	133	37	2	111	112	5	4	0
Wendung und Ex- traktion	18 = 5,9%	6 = 33,3%	1	0	3	5	10	0	2	16	0	6	6
Tiefe Zange	7 = 2,3%	0	2	0	2	4	1	0	5	2	0	1	0
Hohe Zange	3 = 0,98%	0	0	0	0	2	1	0	1	2	0	0	0
Kaiserschnitt	11 = 3,61%	1 = 9,1%	4	5	0	3	3	5	4	7	0	0	0
Künstliche Früh- geburt	22 = 7,21%	8 = 36,36%	6	0	0	7	13	2	1	21	4	0	9
Perforation	11 = 3,61%	11	4	0	0	3	7	1	5	6	0	2	0
Manualhilfe bei Beckenendlage. . .	5 = 1,64%	2 = 40%	1	0	1	2	1	1	3	2	5	0	0
Handgriff der Siegel- mundin	2 = 0,66%	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0
Laparotomie wegen Uterusruptur . . .	3 = 0,98%	2	0	2	0	1	2	0	0	3	0	1	1
Summe	305	36 = 11,8%	44	7	57	160	77	11	134	171	14	15	16

Erläuterungen zu den Tabellen.

Die Hauptmenge der engen Becken findet sich bei den leichteren und mittleren Graden der Beckenverengerung. Bei einer Veralänge von 9,5 — 8,6 konnten 177, bei einer Länge von 8,5 — 7,6 100 Fälle verzeichnet werden, während die höheren Grade der Beckenenge zwischen 7,5 und 6,5 Veralänge nur durch 15 Fälle vertreten sind. Der auf den ersten Blick überraschende Umstand, dass der geringste Grad des engen Beckens bei den Geburten in den Tabellen 1 und 2 mit weit kleineren Zahlen vertreten ist als der nächst höhere, erklärt sich leicht dadurch, dass bei diesem geringen Grade der Veraverkürzung nicht übermässig grosse Kinder das Becken passieren, ohne dass sich überhaupt irgend welche Schwierigkeiten zeigen, die zu einer inneren Beckenmessung Veranlassung geben. Besonders bei dem grossen Anteil, den das poliklinische Material an den Geburten hat, ist dieser Umstand von Bedeutung.

Die meisten Geburten in dem von mir bearbeiteten Materiale entfallen auf Mehrgebärende. Ihre Zahl beträgt nach Tabelle 1 $210 = 60,17\%$; die der Erstgebärenden $139 = 39,83\%$. Zieht man noch Tabelle 2 mit in Betracht, so ergeben sich für Mehrgebärende $61,54\%$, für Erstgebärende $38,46\%$. Baisch findet folgenden Prozentsatz: Mehrgebärende 72% , Erstgebärende 28% . Am nächsten steht das von mir ermittelte Verhältnis von Mehrgebärenden zu Erstgebärenden dem von Krönig aufgestellten Verhältnis: 64% zu 36% . Bei Chrobaek ist das Verhältnis umgekehrt: auf 60 Erstgebärende kommen 40 Mehrgebärende.

Über die Dauer der Spontangeburt fand ich folgendes:

10,0 — 9,6 Primiparae 15 Stunden,
Multiparae $13\frac{3}{4}$ Stunden.

9,5 — 8,6 Primiparae 19 Stunden,
Multiparae $13\frac{5}{4}$ Stunden.

8,5 — 7,6 Primiparae 18 Stunden,

Multiparae 16 „

7,5 — 6,5 Primiparae 19 „

Baisch erhielt folgende Zahlen:

10,0 — 9,6 Primiparae $15\frac{3}{4}$ Stunden,

Multiparae $10\frac{1}{2}$ „

9,5 — 8,6 Primiparae $17\frac{1}{2}$ — 18 Stunden,

Multiparae $12\frac{3}{4}$ — 11 „

8,5 — 7,6 Primiparae 27 — $24\frac{1}{2}$ „

Multiparae $14\frac{3}{4}$ — 14 „

7,5 — 7,0 Primipara 31 Stunden.

Ich bemerke, dass meine Angabe der Geburtsdauer bei Erstgebärenden mit Vera 7,5 — 6,5 sich nur auf 2 Geburten stützt, von denen die eine 30,5, die andere nur 7 Stunden dauerte, eine bei dieser hochgradigen Verengerung auffallend kurze Zeit, die wohl nur als zufällig zu betrachten ist. Es verliert dadurch natürlich meine Angabe über die Dauer der Geburten bei den höheren Graden der Beckenverengerung ihre Bedeutung. Doch ist die von mir aufgestellte Tabelle über die Geburtsdauer doch insofern von Wert, als sie zeigt, dass, wenn man nach v. Winckel für das normale Becken die Dauer der Geburt bei Primiparen auf $15\frac{1}{2}$ — 30, bei Multiparen auf $8\frac{1}{2}$ — 16 Stunden oder nach Veit jene auf 22, diese auf 15 Stunden angibt, keine erhebliche Verzögerung der Geburt bei Becken mit Vera 10,5 — 8,6 besteht.

Was die Frequenz der Spontangeburt anbelangt, so geht aus Tabelle 1 und 2 hervor, dass dieselbe um so geringer wird, je hochgradiger die Beckenverengerung ist. Die Spontangeburt erfolgten bei einer Vera von

9,5 — 8,6 in 40,4 %

8,5 — 7,6 „ 11,75 %

7,5 — 6,5 „ 6,57 %.

Die Abnahme der ohne operative Hilfe verlaufenen Geburten mit der Verkürzung der Vera ist also eine geradezu rapide.

Im ganzen nahmen unter 349 Geburten bei engem Becken nach Tabelle 1 235, = 67,3 %, einen spontanen Verlauf. Heinsius fand einen Spontanverlauf von 60 Geburten auf 139 = 43,16 %. Lässt man die Geburten bei den hochgradig verengten Becken, also von Vera 7,5 an abwärts, aus der Berechnung fort, so bekommt man eine Frequenz der Spontangeburt von 70,36 %. Baisch findet die Häufigkeit der ohne Kunsthilfe verlaufenen Geburten in der soeben angegebenen Veralänge von 10,0—7,6 zu 83,3 %. Dieser Unterschied zwischen der Frequenz der Spontangeburt in der Tübinger und der Breslauer Klinik erklärt sich zu seinem grössten Teile ungezwungen einfach dadurch, dass, wie schon oben bemerkt, das Vorkommen jener sehr geringfügigen, praktisch so gut wie bedeutungslosen Beckenverengerungen, bei denen die Geburt, wenn im übrigen normale Verhältnisse vorliegen, fast stets spontan verläuft, in meiner Statistik bedeutend zu niedrig angegeben ist.

Nach Baisch beträgt die Frequenz aller Spontangeburt bei engem Becken, die platten Becken von der Veralänge 10,0—9,6 abgerechnet, bei Döderlein 80 %, bei Pinard 79 %, bei Zweifel 78 %, bei Fritsch 63 %, bei Gusserow 60 %, bei Chrobak 54 % und bei Braun, der mit Chrobak zusammen ein warmer Anhänger der prophylaktischen Operationen ist und Kaiserschnitt und Beckenerweiterung verwirft, nur 36 %.

Die Mortalität der Kinder bei den Spontangeburt beläuft sich nach Tabelle 1 und 2 im ganzen auf 12 = 2,98 % Todesfälle. Die mütterliche Mortalität ist 0. Was die Morbidität der Mütter anbetrifft, so hatten 8 eine einmalige Temperatursteigerung auf 38° und darüber; meist handelte es sich um leichte Mastitiden; 16 hatten mehrtägiges Fieber; bei einer von ihnen dauerte dasselbe 5 Wochen und war von re- und intermittierendem Typus. Einmal lag eine Lungenkomplikation vor. Eine Puerpera bekam Eklampsie. Die Morbidität der Mütter beträgt demnach 6,23 %. Heinsius berechnet die Prozentzahl der infolge der Geburt fiebernden Wöchnerinnen auf 5 %.

Von den operativ geleiteten Geburten ist die Mortalität der Kinder, wenn man von der bei Beckenendlage geleisteten Manualhilfe zunächst absieht, am höchsten bei der Wendung und Extraktion. Auf 36 Wendungen kommen in Tabelle 1 15 tote Kinder. Dieser Operation haftet also eine Mortalität von 41,67 % an oder von 25,42 % im Hinblick auf die Gesamtmortalität, während die Durchschnittsmortalität in derselben Tabelle inklusive der Perforationen nur 22,5 % beträgt. Ein Fall bei der Vera 9,5 — 8,6 ist allerdings darunter, der nicht ganz rein ist, sondern kompliziert durch Placenta praevia. Es wurde Hystereuryse vorgenommen, das Kind kam lebend zur Welt, starb aber bereits nach 2 Tagen. Tabelle 2 bietet ähnliche Verhältnisse dar und auch Tabelle 3 demonstriert die hohe kindliche Sterblichkeit, die mit der Wendung und Extraktion verknüpft ist. Diese Operation wurde bei normaler Schädel-lage wegen drohender Asphyxie oder übermässiger Dehnung des unteren Uterinsegmentes 11 mal, wegen Querlage 14 mal, wegen Hinterscheitelbeineinstellung 15 mal, wegen Nabelschnurvorfalles 10 mal, bei Stirnlage und Placenta praevia je 1 mal ausgeführt. Jedenfalls wird an der Breslauer Klinik die Indikation zu ihr niemals durch das enge Becken als solches gegeben, sondern nur durch Komplikationen der eben angeführten Art. Das Wochenbett war bei den durch Wendung und Extraktion entbundenen Müttern 3 mal leicht febril, einmal infolge einer Pneumonie hoch febril.

Was die hohe Zange anbetrifft, so wurde sie im ganzen 5 mal gemacht. In allen 5 Fällen lag drohende Asphyxie vor, einmal verbunden mit Hochstand des Kontraktionsringes, einmal mit Wehenschwäche. Nur ein Kind starb und dieser Fall ist nicht einmal der hohen Zange zur Last zu legen; denn bereits vor Anlegung derselben waren die Herztöne vor ganz kurzer Zeit plötzlich verschwunden; die hohe Zange sollte als schnellstes Entbindungsverfahren im vorliegenden Falle nur als ein letzter verzweifelter Versuch zur Rettung des Kindes gemacht werden. Sie gelang leicht und ohne Schwierigkeit; man ist daher zu der Annahme

berechtigt, dass das Kind bereits abgestorben war, bevor es durch die Löffel der Zange gefasst wurde. Die Mortalität und Morbidität der Mütter ist 0. Somit haben wir also ein wahrhaft glänzendes Resultat der hohen Zange zu verzeichnen. Ich muss daher auf Grund der vorliegenden Statistik der Behauptung Kretschmers (Die Geburten bei engem Becken, Diss. Breslau 1907), die Prognose der hohen Zange sei hinsichtlich der Kindermortalität sowie der mütterlichen Morbidität und Mortalität nicht besser als die der Wendung und Extrak tion, entschieden entgegnetreten. Selbstverständlich will ich auf Grund einer so geringen Anzahl von Fällen, wobei man doch dem Zufall ein sehr grosses Feld einräumen muss, kein abschliessendes Urteil über den Wert oder Unwert der hohen Zange fällen, zumal namhafte Autoren auf Grund umfassender Erfahrung zu ganz entgegengesetzten Ansichten gekommen sind. So sind Tauffer, Tóth, Wenzel und Schultz eifrige Verteidiger der hohen Zange, während Krönig und Zweifel dieselbe völlig verwerfen, da sie mit ihr fast nur tote Kinder erhielten. Olshausen sagt von der hohen Zange, sie passe wie die Faust aufs Auge.

Die Perforation (Tab. 1 und 2) wurde im ganzen 20 mal am vorliegenden Schädel ausgeführt, 9 mal bei Erstgebärenden, 11 mal bei Mehrgebärenden. Bei beiden Primiparen lag hochgradige Ausziehung des unteren Uterinsegmentes vor; die eine mit Vera 9,5 — 8,6 fieberte 8 Tage im Wochenbett: in den ersten 3 Tagen war der Urin blutig. Das Wochenbett der anderen Erstgebärenden mit einer Vera von 7,5 — 6,5 war afebril. 3 mal wurden lebende Kinder bei Mehrgebärenden bei einer Veralänge von 9,5 — 7,6 perforiert. In allen 3 Fällen war wegen der gefahrdrohenden Ausziehung des unteren Uterinsegmentes die Entbindung dringend indiziert. Wendung oder hohe Zange waren ausgeschlossen, da sie nicht ohne die allergrösste Lebensgefahr für die Mutter, namentlich in der poliklinischen Praxis, hätten ausgeführt werden können. Es blieb also nur die Opferung des kindlichen Lebens als einzige Möglichkeit übrig, die Mutter zu

erhalten. Die sämtlichen übrigen Perforationen wurden an abgestorbenen Kindern vollzogen; 5 mal war die Nabelschnur vorgefallen, 3 mal bestand Tetanus uteri, 3 mal befand sich der Kopf in Hinterscheitelbeineinstellung, 1 mal lag Eklampsie und 1 mal vorzeitige Placentarlösung vor, 1 mal Fieber mit Zersetzung des Fruchtwassers und 1 mal Placenta praevia, wobei der Hystereurynter die Nabelschnur komprimiert und so den Tod des Kindes mit verschuldet hatte. Das Wochenbett war in 4 Fällen febril.

Die künstliche Frühgeburt wurde 22 mal eingeleitet, 1 mal bei einer Erstgebärenden, 21 mal bei Mehrgebärenden. Auf die Veralänge 9,5—8,6 fallen 7 Frühgeburten, alle bei Mehrgebärenden; 1 mal musste die Frühgeburt eingeleitet werden wegen schwerer exazerbierender chronischer Polyarthrits rheumatica. In den anderen Fällen wies die Anamnese deutlich auf einen zu erwartenden schweren Geburtsverlauf hin. So findet sich anamnestisch 4 mal die Perforation, 1 mal Blasenscheidenfistel und sonst übermässig lange Geburtsdauer. Das Wochenbett war, wenn man den durch Rheuma komplizierten Fall abrechnet, nur bei einer Wöchnerin durch einmalige Temperatursteigerung auf 38,2° gestört. Das Hauptkontingent aller künstlichen Frühgeburten gaben die mittleren Grade der Beckenverengung ab. Bei einer Vera von 8,5 -- 7,6 sind 13 Fälle verzeichnet, darunter sogar einer bei einer Erstgebärenden. Im allgemeinen wird die künstliche Frühgeburt an der Breslauer Klinik, abgesehen von Verengungen höheren Grades, möglichst nie bei Erstgebärenden gemacht, da man aus mindestens einer exspektativ behandelten Geburt erschen will, ob bei der betreffenden Frau das Missverhältnis zwischen dem Geburtsobjekte und den Geburtswegen die künstliche Frühgeburt rechtfertigt. 12 Frühgeburten fallen auf Mehrgebärende, von ihren Kindern starben 5; 2 mal bestand im Wochenbett Cystitis, einmal mit Fieber, das andere Mal ohne Fieber. In der Anamnese finden sich bei 7 Frauen Perforationen, 2 Frauen bekamen bei früheren Geburten eine Urinfistel. Bei der Vera 7,6 — 6,5 war nur 2 mal die Indikation

zur künstlichen Frühgeburt gegeben. Ein Kind starb. Die Mutter dieses Kindes war 1 mal durch Kaiserschnitt, 1 mal durch Symphyseotomie entbunden worden. Beide Wochenbetten verliefen afebril. Auf 22 Frühgeburten kommen also 8 tote Kinder = 36,4 %, während die Durchschnittsmortalität in Tabelle 1 noch nicht die Hälfte davon ausmacht. Das Wochenbett war im ganzen 6 mal gestört, 1 mal durch eine accidentelle Erkrankung, nämlich Rheuma.

Der Kaiserschnitt wurde bei einer Vera von 9,6 — 8,5 2 mal konservativ bei Erstgebärenden, 1 mal bei einer Mehrgebärenden vorgenommen. Die Indikation war bei den beiden Erstgebärenden durch schwere Eklampsie gegeben. Ihre Kinder leben, die Mütter erlagen ihrer Krankheit. Die Mehrgebärende überstand im Wochenbett eine Oberlappenpneumonie. Ihr Kind lebt. Bei ihrer letzten Geburt war eine spontane komplette Cervixruptur eingetreten. Der nächst höhere Grad der Beckenverengerung 8,5 — 7,6 weist 3 Fälle von Kaiserschnitt auf, welche sämtlich Mehrgebärende betreffen. Ein Kind starb, eine Mutter hatte einmal 38° im Wochenbett, eine andere kam im Wochenbett am 5. Tage ad exitum an Peritonitis purulenta. Sie war ausserhalb der Klinik bereits vielfach untersucht worden, die Blase war kurz vor der Operation geprüngt. Die Frau hatte den sehnsüchtigsten Wunsch nach einem lebenden Kinde. Ihre früheren Kinder waren entweder perforiert worden oder kurz nach der Geburt gestorben. — Von den 5 Fällen von Kaiserschnitt bei einer Vera von 7,5 — 6,5 entfallen 2 auf Erstgebärende; beide Kinder leben. Das Wochenbett der einen war an drei aufeinanderfolgenden Tagen durch leichtes Fieber gestört; die andere Primipara starb an grosser weisser Niere. Die Wundverhältnisse waren einwandfrei. Es wurde hier nach Porro operiert, da die Frau bereits ausserhalb der Klinik untersucht worden war. 3 mal wurde der Kaiserschnitt an Mehrgebärenden ausgeführt, 2 mal konservativ, 1 mal nach Porro. In letzterem Falle war die Frau erst nach langem Kreissen mit gesprungener Blase in die

Klinik gekommen. Sie starb im Wochenbett an Pneumonia gelatinosa; ihr Kind lebt. Von den beiden anderen Graviden, die noch bei stehender Blase zur Operation kamen, hatte die eine 2 Tage hindurch im Puerperium leichtes Fieber; beide Kinder leben. — Es starben also von 11 Fällen von Kaiserschnitt 5 Mütter = 45,45 %. Die einzige Mutter, die einer puerperalen Sepsis erlag, war schon vor Aufnahme in die Klinik von der Hebamme vielfach untersucht worden, also höchstwahrscheinlich schon infiziert. Die Blase war schon vor der Operation gesprungen; der Kaiserschnitt wurde nur auf ausdrückliches Verlangen der Frau ausgeführt. Die übrigen Mütter starben, wie soeben dargelegt, sämtlich an extragenitalen Erkrankungen, nämlich 2 an Eklampsie, 1 an Nephritis und 1 an Pneumonie.

Der alte doppelte Handgriff der Siegemundin, von dem Bumm sagt, er gehöre einer überwundenen Periode der geburtshilflichen Operationskunst an, kam in den 3 Jahren, die ich bearbeitet habe, 2 mal zu Ehren. Beide Kinder leben; von den Müttern hatte die eine im Wochenbett eine Cystitis mit Fieber.

Die typische Zange wurde nach Tabelle 1 und 2 im ganzen 17 mal angelegt. Die Indikationen waren drohende Asphyxie, übermässige Cervixdehnung, Wehenschwäche, Erschöpfung der Kreissenden und Fieber. 2 Kinder starben = 11,77 %. Heinsius verzeichnet eine Mortalität von 14,2 %. Von den Müttern hatten 5 im Wochenbett Fieber = 29,41 %. Heinsius fand einen Prozentsatz von 13 % fiebernden Müttern.

Manualhilfe wurde bei Beckenendlage nach Tabelle 1 und 2 10 mal geleistet. Die Indikation gab in allen Fällen drohende Asphyxie des Kindes. Es starben 7 Kinder und zwar bei Entwicklung des Kopfes; 4 mal musste derselbe perforiert werden. Eine Mutter bekam eine Blasenscheidenfistel, eine Mutter hatte an 2 Tagen hintereinander Temperaturen bis 38,4 °.

Die Laparotomie wegen Uterusruptur musste 3 mal vorgenommen werden. In allen 3 Fällen handelt es sich

um Spontanrupturen bei Mehrgebärenden. Bei der Vera 9,5 bis 8,6 ereignete sich die Gebärmutterzerreissung 1 mal und zwar bei Stirnlage. Das Kind wurde durch Kranio-klasie nach vorausgegangener Perforation extrahiert. Die Mutter starb 10 Stunden post laparotomiam. — Die beiden anderen Rupturen finden sich bei einer Veralänge von 8,5—7,6 vor; in beiden Fällen lagen Kind und Placenta in der Bauchhöhle. Einmal konnte das Kind mit Placenta per vias naturales extrahiert und dann die Naht des Uterusrisses vorgenommen werden; im anderen Falle musste das Kind mit der Placenta durch die Bauchwunde entfernt werden; diese Mutter starb am Tage nach der Operation, jene konnte nach $2\frac{3}{4}$ Wochen geheilt entlassen werden.

Zum Schlusse meiner Arbeit stelle ich die Hauptresultate der Geburten beim engen Becken in den Jahren von 1894 bis 1903 zur Orientierung in einer kurzen Tabelle zusammen, welche zeigt, dass die Endresultate der hiesigen Geburtsleitung im wesentlichen unverändert geblieben sind:

	Operations- frequenz	Kindliche Mortalität	Mütterliche Morbidität	Mütterliche Mortalität
1894 — 1897	56,84 %	19,7 %	15 %	4,3 %
1897 — 1900	60 %	22,5 %	13,7 %	5 %
1900 — 1903	35,24 %	18,61 %	13,65 %	1,47 %

Herrn Geheimrat Küstner sowie Herrn Oberarzt Dr. Hannes sei an dieser Stelle für die Anregung zu dieser Arbeit und ihre Durchsicht ergebenst gedankt.

Literatur=Verzeichnis.

Betreffs der in den letzten Jahren ungeheuer angeschwollenen Literatur über die Geburten bei engem Becken verweise ich auf den sehr ausführlichen Literaturnachweis am Schlusse des Werkes von Baisch, Reformen in der Therapie des engen Beckens, Leipzig 1907. — Ich führe nur einige wichtige Werke auf, sowie einige ganz neue, die von Baisch noch nicht angegeben sind.

Beuthner: Zur Frage der Einleitung der künstlichen Frühgeburt bei Beckenenge. Arch. f. Gyn. 1895, Bd. 48.

Bröse: Über die Wendung bei Erstgebärenden mit engem Becken. Ztrbl. f. Gyn. 1904.

Chrobak: Berichte aus der II. geburtsh. gyn. Klinik, Wien 1897.

Döderlein: Die moderne Indikationsstellung der geburts-hilf. Operationen, insbesondere über beckenerweiternde Operationen. Ztrbl. 1904, p. 561.

Heinsius: Die Geburten bei engem Becken in den Jahren 1894/95 — 1896/97. Diss. Breslau 1898.

Krönig: Die Therapie beim engen Becken. Leipzig 1901.

Litzmann: Über den Einfluss der einzelnen Formen des engen Beckens auf die Geburt. Smml. kl. Utr. N. 74 1874.

Kretschmer: Die Geburten bei engem Becken in den Jahren 1897/98 — 1899/1900. Diss. Breslau 1907.

Banasz: Die Stellung des Kaiserschnitts zu konkurrierenden Verfahren auf Grund der Operationsresultate der letzten Jahre. Diss. Breslau 1907.

Lebenslauf.

Paul Wilhelm Johannes Kapischke, Preusse, evangelischer Konfession, wurde am 9. Oktober 1881 zu Rügenwalde geboren. Das Abiturientenexamen bestand er Ostern 1901 am Königl. Domgymnasium zu Kolberg. Er studierte 2 Semester in Greifswald, 3 in Marburg, wo er am Schlusse des Sommersemesters 1903 die ärztliche Vorprüfung bestand. Im Wintersemester 1903/04 studierte er in Halle und diente zu gleicher Zeit im Füsilierregimente No. 36. In Königsberg lag er 5 Semester hindurch den klinischen Studien ob, von Ostern 1904 bis Herbst 1906. Die Staatsprüfung beendete er Anfang Mai 1907.

Allen meinen akademischen Lehrern aufrichtigen Dank!
